


*Eryngium Barrelieri**Eryngium alpinum**Eryngium Spina-alba**Eryngium Bourgati*

1460. — *Eryngium Barrelieri* Boiss. — Plante bisannuelle de 5-20 cm., d'un vert gai, à souche tronquée; tige dressée, peu feuillée, rameuse-dichotome au sommet; feuilles radicales oblongues-lancéolées, atténuées en un long pétiole ailé non épineux, toutes crénelées ou incisées-dentées à dents spinescentes; fleurs blanches, en têtes nombreuses, serrées, sessiles, terminales et axillaires; involucre à folioles nombreuses, étalées, linéaires-acuminées, avec 2 épines latérales; paillettes égalant l'involucre; calice fructifère à dents étalées; fruit ovoïde-cylindrique, couvert d'écaillés ponctuées.

Marais des côtes de la Corse, près de Bonifacio. — Sardaigne, Sicile, Italie méridionale; Syrie; Tunisie, Algérie. = Mai-juin.

1461. — *E. alpinum* L. Reine des Alpes. — Plante vivace de 30-60 cm., bleuâtre, à souche épaisse; tige dressée, simple ou un peu rameuse au sommet; feuilles inférieures ovales en cœur et comme hastées, obtuses, peu coriaces, dentées-épineuses, les supérieures palmatifides, incisées-dentées; fleurs blanches, en 1-3 têtes terminales, oblongues ou cylindriques, longuement pédonculées; involucre bleuâtre, à 10-20 folioles presque molles, étalées-dressées, faiblement nervées, étroites, longuement pectinées-épineuses; paillettes du réceptacle bien plus courtes que l'involucre, les extérieures bi-trifides; calice fructifère à dents dressées; fruit obovale, muni de quelques écaillés obtuses.

Prairies et pâturages des hautes montagnes: Jura; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence. — Suisse; Italie; Croatie, Carniole, Carinthie; Bosnie; Monténégro. = Juillet-août.

1462. — *E. Spina-alba* Vill. — Plante vivace de 20-40 cm., blanchâtre, très épineuse, à souche épaisse; tige robuste, dressée, très rameuse dès la base; feuilles très coriaces, fortement nervées, suborbiculaires-palmatifides, à segments profondément divisés en lobes étalés dentés-épineux; fleurs blanches, en têtes ovales pédonculées; involucre d'un blanc argenté, à 10-20 folioles dressées, lancéolées-linéaires, pennatifides-épineuses, très coriaces, fortement nervées; paillettes entières, les extérieures trifides; calice fructifère à dents dressées; fruit ovoïde, couvert d'écaillés lancéolées-aiguës.

Éboulis et rochers des montagnes calcaires du Sud-Est: Vaucluse, Drôme, Isère, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes. — Italie, dans la Ligurie. = Juin-juillet.

1463. — *E. Bourgati* Gouan. — Plante vivace de 20-40 cm., bleuâtre, très épineuse, à souche épaisse; tige dressée, simple ou rameuse au sommet; feuilles coriaces, suborbiculaires-palmatifides, à segments oblongs ou lancéolés profondément divisés en lobes divergents épineux; fleurs bleues, en têtes ovoïdes pédonculées; involucre d'un vert bleuâtre, à 10-12 folioles étalées-dressées, linéaires-lancéolées, entières ou à 1-3 dents de chaque côté, coriaces, fortement nervées; paillettes entières; calice fructifère à dents dressées; fruit obovale, couvert d'écaillés ovales-obtuses.

Pâturages et lieux incultes de toute la chaîne des Pyrénées. — Espagne. = Juillet-août.