

1464. — *Eryngium maritimum* L. — Plante vivace de 30-60 cm., d'un glauque bleuâtre, très épineuse, à souche émettant des stolons souterrains; tige dressée, rameuse; feuilles coriaces, orbiculaires en rein, palmatilobées, à lobes étalés, anguleux, dentés-épineux, les caulinares moyennes à gaine non épineuse; fleurs bleuâtres, en grosses têtes subglobuleuses, pédonculées; involucre bleuâtre, à 4-6 folioles étalées, larges, ovales ou rhomboïdales, coriaces, incisées-épineuses; paillettes extérieures à 3 épines divergentes; calice fructifère à dents étalées en étoile; fruit obovale, muni d'écaillés acuminées.

Sables maritimes des côtes de la Manche, de l'Océan et de la Méditerranée; Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Juin-septembre.



Eryngium maritimum

1465. — *E. campestre* L. Chardon roulant. — Plante vivace de 30-60 cm., d'un vert blanchâtre, très épineuse, à souche épaisse; tige dressée, robuste, très rameuse; feuilles coriaces, largement ovales, 1-2 fois pennatifidées, à segments décourants, lobés-dentés, épineux, à pétiole auriculé-épineux; fleurs blanches, en têtes globuleuses ou ovoïdes, pédonculées; involucre blanchâtre, à 4-6 folioles étalées, étroites, linéaires-acuminées, entières ou dentées; paillettes du réceptacle entières; calice fructifère à dents dressées; fruit obovale, couvert d'écaillés acuminées.

Lieux arides, surtout calcaires, dans presque toute la France et en Corse. — Europe méridionale et centrale, jusqu'au Danemark; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Juillet-septembre. — On mangeait autrefois sa racine, qui passe pour diurétique, apéritive, emménagogue.



Eryngium campestre

Genre 258. — DAUCUS L. — Carotte.

(Du grec *daucos*, nom donné par les Grecs à diverses Ombellifères.)

Calice à 3 dents très courtes, dressées; pétales émarginés, à pointe courbée en dedans, les extérieurs souvent rayonnants, bifides; styles courts; fruit ovale ou elliptique, un peu comprimé par le dos, hérissé d'aiguillons; méricarpes à 9 côtes, 5 primaires, filiformes, hérissées de soies divergentes, 4 secondaires plus grandes, ailées, armées d'aiguillons disposés sur 1 seul rang; vallécules à 1 bandelette; carpophore libre, bifide; graine à face commissurale plane.

Fleurs blanches ou rosées, en ombelles régulières à 8-40 rayons, offrant souvent au centre une fleur purpurine stérile; involucre à folioles nombreuses, pennatiséquées; involucelle à folioles simples ou trifides; feuilles inférieures bi-tripennatiséquées, à segments pétiolés; plantes plus ou moins hérissées, à racine pivotante.

Environ 20 espèces indigènes ou introduites dans presque tout le globe.

TABEAU DES ESPÈCES

Fruit gros, égalant celui de l'*Orlaya platycarpus*, armé d'aiguillons très élargis et confluent à la base; côtes de la commissure très rapprochées, contiguës, parallèles; feuilles tripennatiséquées, à lobes linéaires-étroits; plante annuelle.

D. muricatus 1466

Fruit beaucoup plus petit, hérissé d'aiguillons peu ou point élargis à la base; côtes de la commissure écartées, convergentes au sommet et à la base; feuilles inférieures à lobes ovales, oblongs ou lancéolés; plantes bisannuelles.