

Environ 30 espèces habitant l'hémisphère boréal des deux mondes et la Nouvelle-Zélande.

TABLEAU DES ESPÈCES

Folioles larges, ovales-lancéolées, non ou rarement atténuées à la base; pétales à pointe dressée; fruit à ailes marginales plus larges que le méricarpe, plus ou moins ondulées.

A. silvestris 1499

Folioles lancéolées, plus ou moins atténuées ou en coin à la base; pétales à pointe courbée en dedans; fruit à ailes marginales épaisses, plus étroites que le méricarpe.

A. heterocarpa 1500

Folioles lancéolées, rapprochées et décurrentes à la base; pétales à pointe roulée en dedans; fruit à ailes marginales aussi larges que le péricarpe. . **A. Razulii** 1501

✓ **1499. — Angelica silvestris** L. *Angélique sauvage*. — Plante bisannuelle ou vivace, dépassant souvent 1 mètre; tige glauque ou rougeâtre, épaisse, creuse, striée, rameuse dans le haut; feuilles très amples, bipennées, à folioles écartées, grandes, ovales-lancéolées, dentées en scie, les supérieures non décurrentes; fleurs blanches ou rosées; ombelles grandes, à 20-30 rayons pubescents; involucre ordinairement nul; pétales à pointe dressée; fruits longs de 5 mm. sur 4 de large, tous de même forme, ovales, à ailes marginales membraneuses, plus ou moins ondulées, plus larges que le méricarpe.

Varie à folioles inférieures sessiles, les supérieures décurrentes, toutes finement dentées (var. *ELATIOR* G. G.; *A. MONTANA* Schl.).

Prairies, ravins et bois humides, dans presque toute la France; rare dans le Midi; Corse. — Europe, surtout centrale et boréale; Asie Mineure, Caucase, Sibérie. = Juillet-septembre.

1500. — A. heterocarpa Lloyd. — Plante vivace de 1 à 2 mètres, à tige très creuse, lisse, cannelée et rude-pubescente dans le haut; feuilles très amples, bipennées, à folioles lancéolées ou ovales-lancéolées, atténuées ou en coin à la base, finement dentées en scie, à dents terminées en pointe scariée; fleurs blanches; ombelles grandes, à 25-35 rayons pubescents; involucre nul ou à 1-3 folioles plus ou moins caduques; pétales à pointe courbée en dedans; fruit long de 4-6 mm. sur 2-3 de large, variable, ovale ou elliptique, à côtés obtuses, les marginales un peu plus grandes ou dilatées en forme d'ailes épaissies, plus étroites que le méricarpe.

Bords vaseux des rivières baignées par la marée: Gironde, Charente-Inférieure, Loire-Inférieure. Espèce spéciale à l'Ouest de la France. = Juillet-août.

✓ **1501. — A. Razulii** Gouan. — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, à tige creuse, striée, rameuse; feuilles inférieures grandes, bipennées, à folioles rapprochées, lancéolées-aiguës, décurrentes à la base, finement dentées en scie; fleurs rosées ou blanches; ombelles grandes, à 25-40 rayons cendrés-pubescents; involucre à 1-5 folioles longuement linéaires, à la fin caduques; pétales à pointe roulée en dedans; fruit ovale-oblong, à peine échancré à la base, à ailes marginales membraneuses, aussi larges que le méricarpe.

Prairies et pâturages de presque toute la chaîne des Pyrénées. — Espagne septentrionale, = Juin-août.



Angelica silvestris



Angelica heterocarpa



Angelica Razulii