

Genre 271. — ANETHUM L.

(Du grec *anêton*, fenouil, dérivé de *aithô*, je brûle : plante ressemblant au fenouil et à graine âcre.)

1504. — *Anethum graveolens* L. *Fenouil bâtard*. — Plante annuelle de 20-50 cm., glabre, glaucescente, fétide, à racine pivotante; tige grêle, striée, creuse; feuilles tripennatiséquées, toutes finement divisées en lanières filiformes, les supérieures sessiles sur une gaine plus courte que le limbe; fleurs jaunes, en ombelles à 15-30 rayons inégaux; involucre et involucre nuls; calice à limbe nul; pétales entiers, sub-orbiculaires-tronqués, à pointe courbée en dedans; fruit ovale-elliptique, comprimé par le dos, entouré d'un large rebord plan; méricarpes à 5 côtes, les trois dorsales saillantes, filiformes, carénées, les deux marginales dilatées en aile aplatie; graine à face commissurale plane.



Anethum graveolens

Moissons et cultures çà et là dans la région méditerranéenne; cultivé et subsontané ailleurs. = Europe méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. — Plante carminative et diurétique, sert à aromatiser le linge.

Genre 272. — PEUCEDANUM L.

(Du grec *peucé*, pin, *danos*, combustible : allusion aux lobes linéaires des feuilles et à l'odeur résineuse de plusieurs espèces.)

Calice à 5 dents, rarement nulles; pétales obovales, égaux, émarginés ou presque entiers, à pointe courbée en dedans; styles réfléchis; fruit elliptique ou suborbiculaire, comprimé par le dos, entouré d'un rebord plan; méricarpes à 5 côtes, les 3 dorsales filiformes, les 2 marginales dilatées en aile plus ou moins amincie; vallécules à 1 ou 3 bandelettes; carpophore libre, bifide; graine à face commissurale plane.

Fleurs blanches, roses, verdâtres ou jaunâtres, en ombelles à 5-40 rayons; involucre et involucre nuls ou à plusieurs folioles; feuilles 1-4 fois pennatiséquées, les inférieures longuement pétiolées; plantes vivaces, glabres.

Environ 100 espèces habitant l'hémisphère boréal des deux mondes, l'Afrique et l'Amérique tropicales.

TABLEAU DES ESPÈCES

Involucre nul ou à 1-4 folioles caduques.

Fleurs blanches ou rosées; styles plus longs que le stylopode.

Feuilles tripennées à folioles larges, ovales ou lancéolées, dentées en scie; racine tubéreuse; ombelles à 20-40 rayons; calice à limbe nul; fruit beaucoup plus court que le pédicelle, suborbiculaire, échancré aux 2 bouts, largement ailé.

P. Ostruthium 1503

Feuilles divisées en lanières linéaires ou lancéolées-acuminées, divariquées; racine non tubéreuse; ombelles à 5-20 rayons; calice à 5 dents; fruit elliptique, égalant le pédicelle ou plus long.

Plante de 60 cm. à 1 mètre, d'un vert gai, à tige droite; feuilles inférieures tripennatiséquées, à segments pétiolulés, divisés en lanières linéaires, entières; ombelles à 10-20 rayons; involucre à 4-8 folioles; fruit petit, égalant à peu près le pédicelle. *P. gallicum* 1506

Plante de 20-50 cm., glaucescente, à tige flexueuse; feuilles inférieures pennatiséquées, à segments sessiles, à 2-4 lobes lancéolés-acuminés; ombelles à 5-12 rayons; involucre nul ou à 1-4 folioles; fruit gros, plus long que le pédicelle.

P. Schottii 1507

Fleurs verdâtres ou jaunâtres.

Feuilles inférieures bi-pennatiséquées, à segments sessiles, divisés en lanières linéaires-lancéolées à pétiole triangulaire, canaliculé en dessus; ombelles à 6-12 rayons; styles plus longs que le stylopode. *P. carvifolium* 1508