

- Feuilles inférieures triternatiséquées, à segments pétiolés, divisés en longues lanières linéaires, à pétiole cylindrique, non canaliculé; ombelles à 10-20 rayons; styles égalant le stylopode ou plus courts.
- Feuilles divisées en lanières filiformes en alène, canaliculées; ombelles nombreuses, divariquées, formant une panicule; styles plus courts que le stylopode; fruit grand, oblong. *P. paniculatum* 1509
- Feuilles divisées en lanières longuement linéaires-acuminées; ombelles grandes, dressées, non disposées en panicule; styles égalant le stylopode; fruit petit, oboval. *P. officinale* 1510
- Involucre à plusieurs folioles persistantes.
- Involucre à folioles étalées, non réfléchies; tige creuse, cannelée.
- Fleurs jaunâtres, petites, en ombelles à 6-20 rayons courts et assez épais, non rudes; styles à peine plus longs que le stylopode; fruit ovale, émarginé à la base, glabre *P. alsaticum* 1511
- Fleurs blanches, plus grandes, en ombelles, à 6-15 rayons rudes du côté interne; styles 1 fois plus longs que le stylopode; fruit étroitement ovale, pubescert. *P. venetum* 1512
- Involucre à folioles réfléchies.
- Tige creuse; pétiole cylindrique, subcanaliculé en dessus; bandelettes de la commissure cachées par le péricarpe.
- Feuilles inférieures divisées en lanières linéaires-allongées, très entières; fleurs d'un blanc jaunâtre en ombelles petites, à 5-12 rayons; styles égalant à peine le stylopode conique; fruit non émarginé. *P. lancifolium* 1513
- Feuilles inférieures divisées en lanières courtes, lancéolées, la plupart lobées ou dentées; fleurs blanches, en ombelles grandes, à 15-30 rayons; styles plus longs que le stylopode discoïde; fruit émarginé au sommet. *P. palustre* 1514
- Tige pleine; pétiole triangulaire, canaliculé en dessus; bandelettes de la commissure non recouvertes par le péricarpe.
- Feuilles divisées en lanières lancéolées-linéaires ou linéaires, entières ou lobées, vertes sur les 2 faces; tige sillonnée-cannelée; fruit grand (8-10 mm. de long), ovale-oblong, à bord élargi et presque transparent. *P. austriacum* 1515
- Feuilles à segments élargis, ovales ou en coin, dentés ou incisés; tige striée; fruit plus petit (4-6 mm. de long), à bord un peu épaissi, non transparent.
- Feuilles vertes sur les 2 faces, à folioles divariquées, ovales en coin, trifides au sommet, à lobes calleux et à peine mucronés; pétioles et pétiolules flexueux-divariqués et comme brisés; ombelles à 10-20 rayons; fruit suborbiculaire, à bord large. *P. Oreoselinum* 1516
- Feuilles glauques en dessous, à folioles étalées, ovales ou elliptiques-lancéolées, lobées-dentées, à dents cuspidées et spinescentes; pétioles et pétiolules droits, à peine sinuieux; ombelles à 15-30 rayons; fruit ovale-elliptique, à bord étroit *P. Cervaria* 1517



1505. — *Peucedanum Ostruthium* Koch. (IMPERATORIA OSTRUTHIUM L. *Impératoire*. — Plante vivace, de 40-60 cm., glabre et verte, à racine tubéreuse; tige creuse, striée; feuilles inférieures tripennées, à folioles ovales ou oblongues, pétiolées, souvent lobées, dentées en scie, les supérieures petites, sessiles sur une gaine renflée; fleurs blanches ou rosées, en ombelles grandes, à 20-40 rayons grêles, très inégaux; involucelle nul; involucelle à folioles caduques; calice à limbe nul; styles plus longs que le stylopode; fruit bien plus court que le pédoncule, suborbiculaire, échancré aux 2 bouts, largement ailé à aile amincie.

Prairies et bords des ruisseaux des montagnes : Vosges; Alpes; Forez, Auvergne, Cévennes; Corbières et Pyrénées; Corse. — Europe centrale, d'Espagne à l'Islande et à la Russie. — Juin-août. — La racine, d'une saveur forte et d'une odeur pénétrante, est employée comme décoriale, stomachique et sudorifique.