



1510. — *Peucedanum officinale* L. — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabre, d'un vert foncé; tige finement striée, pleine; feuilles inférieures grandes, raides, à pétiole cylindrique, non canaliculé, *tripennatiséquées*, à segments pétiorés, découpées en lanières longues, linéaires-acuminées; fleurs jaunâtres, en ombelles grandes, dressées, terminales, à 12-20 rayons grêles, allongés, glabres; involucre à 2-3 folioles caduques; involucelle à folioles nombreuses, linéaires; styles égalant le stylopode; fruit grand, obovate, à bordure épaisse et étroite, bien plus court que le pédicelle.

Bois, prés, champs humides, dans le Midi et l'Ouest; Loire, Cantal, Berry, Alsace. — Juillet-septembre. — Plante emménagogue et diurétique.

1511. — *P. alsaticum* L. — Plante vivace de 50 c. à 1 mètre, glabre, d'un vert sombre; tige cannelée, creuse, à rameaux opposés ou verticillés; feuilles inférieures grandes, à pétiole triangulaire, canaliculé en dessus, *tripennatiséquées*, à segments divisés en lanières oblongues ou linéaires-lancéolées, rudes aux bords; fleurs jaunâtres, petites, en ombelles petites, à 6-20 rayons courts et assez épais, non rudes; involucre et involucelle à plusieurs folioles étalées, linéaires-acuminées, étroitement membraneuses; styles à peine plus longs que le stylopode; fruit ovale, émarginé à la base, glabre; bandelettes de la commissure rapprochées.

Coteaux secs, dans l'Est et le Centre, de l'Alsace à l'Ardèche et à la Loire-Inférieure. — Europe centrale et orientale; Caucase, Sibérie. — Juillet-septembre.

1512. — *P. venetum* Koch. — Voisin du précédent. Plante vivace d'environ 1 mètre, glabre, d'un vert sombre; tige cannelée, creuse, à rameaux supérieurs souvent verticillés; feuilles inférieures grandes, *tripennatiséquées*, à segments pennatifides, divisés en lanières oblongues ou linéaires-lancéolées; fleurs blanches, plus grandes, en ombelles à 6-18 rayons rudes en dedans; involucre et involucelle à plusieurs folioles étalées, non réfléchies; styles 1 fois plus longs que le stylopode; fruit plus étroitement ovale, pubescent; bandelettes de la commissure presque parallèles.

Bois humides du Midi : Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Gard, Pyrénées-Orientales. — Catalogne; Suisse; Italie; Tyrol, Istrie; Croatie; Thessalie. — Août-octobre.

1513. — *P. lancifolium* Lange. (*P. CROUANORUM* Bor.). — Plante vivace d'environ 1 mètre, glabre, ayant le port du *P. gallicum*, mais à souche non chevelue au sommet; tige creuse, striée, très rameuse; feuilles inférieures à pétiole cylindrique, subcanaliculé en dessus, *tripennatiséquées*, à segments opposés, découpés en lanières linéaires, longues de 4-6 cm., très entières; fleurs d'un blanc jaunâtre ou un peu rougeâtre, en ombelles petites, à 5-12 rayons très inégaux, pubescents en dedans; involucre et involucelle à 4-7 folioles réfléchies, linéaires, herbacées; styles égalant à peine le stylopode conique; fruit ovale, non émarginé; bandelettes de la commissure cachées par le péricarpe.

Marais et prés humides de la Bretagne : Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Morbihan, Finistère, Côtes-du-Nord. — Espagne occidentale et Portugal. — Juillet-octobre.