

1529. — *Heracleum montanum* Schl. (H. PANACES G. G. part.). — Plante vivace d'environ 1 mètre, à tige sillonnée-anguleuse, creuse, hérissée-rude; feuilles vertes et glabres en dessus, pubescentes en dessous, les inférieures palmatiséquées-pédalées, à 3 segments, les 2 latéraux lancéolés, bipartits du côté extérieur, le médian profondément divisé en 3 lobes égaux, linéaires-lancéolés; les caulinares ternées, à segments pennatipartits; ombelles à 12-20 rayons; fleurs blanches, à pétales extérieurs rayonnants, bifides, à lobes linéaires-allongés; ovaire pubescent; fruit presque glabre, ovale-suborbiculaire, émarginé au sommet, non ou à peine atténué à la base; commissure à 2 bandelettes.

Pentes ombragées des hautes montagnes : Haut-Jura; Alpes. — Suisse, Italie, Tyrol. = Juin-août.



Heracleum montanum

1530. — *H. setosum* Lapeyr. (H. PANACES G. G. part.). — Plante vivace d'environ 1 mètre, à tige sillonnée-anguleuse, creuse, hérissée-rude; feuilles velues, souvent blanches-tomenteuses en dessous, les inférieures ternées, quelques-unes simples palmatipartites, à 3 segments, les latéraux pétioleulés, pennatipartits, le terminal plus grand, tripartit; feuilles supérieures tripartites; ombelles à 15-40 rayons; fleurs blanches, à pétales extérieurs rayonnants, bifides, à lobes linéaires-oblongs; ovaire velu; fruit fortement pubescent, ovale, tronqué-émarginé au sommet, plus ou moins atténué à la base; commissure à 2 bandelettes.

Prairies et rocaillies des hautes montagnes : Jura; Alpes; Pyrénées. = Espagne; Italie. = Juillet-août.



Heracleum setosum

1531. — *H. Sphondylium* L. Branc-Ursine. — Plante vivace d'environ 1 mètre, à tige robuste, fortement sillonnée-anguleuse, creuse, velue-hérissée; feuilles grandes, pubescentes-blanchâtres en dessous, pennatiséquées, à 3-5 segments ovales, oblongs ou lancéolés, pétioleulés, les inférieurs écartés, dentés, lobés ou pennatipartits; ombelles à 15-30 rayons; fleurs blanches, à pétales extérieurs plus grands, rayonnants, bifides, à lobes oblongs; ovaire pubescent; fruit glabre, obovale, émarginé au sommet; commissure à 2 bandelettes.

Prés et bois humides, dans presque toute la France; nul dans la région méditerranéenne. — Presque toute l'Europe. = Juin-septembre. — Cette espèce sert, dans le Nord, à fabriquer une liqueur alcoolique.



Heracleum Sphondylium

1532. — *H. Lecokii* Godr. et G. — Plante vivace d'environ 1 mètre, à tige robuste, fortement sillonnée-anguleuse, creuse, velue-hérissée; feuilles grandes, cendrées, souvent tomenteuses-blanchâtres en dessous, pennatiséquées, à 3-5 segments ovales, oblongs ou lancéolés, lobés-dentés, les inférieurs pétioleulés, les moyens sessiles, les supérieurs confluent; ombelles à 10-30 rayons; fleurs d'un vert jaunâtre, petites, non rayonnantes, à pétales presque égaux, à onglet court, faiblement échancrés au sommet; ovaire presque glabre; fruit obovale, émarginé au sommet.

Prairies et bois humides des Cévennes et du Plateau central, depuis l'Ardèche et la Haute-Loire jusqu'au Lot et la Haute-Garonne. — Espèce voisine de l'*H. sibiricum* L. et spéciale à la France centrale. = Juin-août.



Heracleum Lecokii