

**Potentilla micrantha****Potentilla fruticosa****Potentilla multifida****Potentilla pensylvanica**

1122. — *Potentilla micrantha* Ram. — Plante vivace de 5-15 cm., velue-soyeuse, à souche épaisse, non stolonifère; tiges très grêles, bien plus courtes que les feuilles, couvertes, ainsi que les pétioles et les pédicelles, de poils mous étalés; *feuilles radicales à 3 folioles obovales-arrondies, velues-soyeuses, munies tout autour de 16-22 dents assez fines et rapprochées, non conniventes; les caulinaires 1 ou 2, simples; fleurs d'un blanc rosé, petites (6-8 mm. de diam.), 1-2 sur des pédicelles filiformes; calicule égalant presque le calice rougeâtre en dedans; pétales peu émarginés, plus courts que le calice; filets des étamines connivents en tube fermé au sommet.*

Bois et rochers, dans l'Est et le Midi, de l'Alsace-Lorraine à l'Auvergne et aux Pyrénées; Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale. = Mars-mai.

1123. — *P. fruticosa* L. — Sous-arbrisseau de 50 cm. à 1 mètre, velu-blanchâtre, très rameux, à écorce s'exfoliant sur les anciens rameaux; tiges dressées ou ascendantes, à rameaux rapprochés, très feuillés, *feuilles imparipennées, la plupart à 5 folioles oblongues-lancéolées, entières, vertes en dessus, pâles en dessous, les 3 supérieures confluentes; fleurs jaunes, peu nombreuses, en cymes terminales; calicule à lobes aussi longs que le calice; pétales obovales, non émarginés, dépassant le calice; carpelles velus-hérissés.*

Varie à tiges basses, couchées, à rameaux courts, écartés, souvent uniflores (*P. PROSTRATA* Lapeyr.).

Pâturages et rochers humides des hautes montagnes: Pyrénées-Orientales, Ariège, Hautes et Basses-Pyrénées; Alpes-Maritimes. — Europe; Asie; Amérique septentrionale. = Juillet-août.

1124. — *P. multifida* L. — Plante vivace de 5-25 cm., tomenteuse-blanchâtre, à souche peu épaisse; tiges ascendantes ou dressées, grêles, pubescentes, peu feuillées; *feuilles petites, imparipennées, découpées en nombreux segments linéaires, entiers, verts et glabres en dessus, soyeux-argentés en dessous; stipules lancéolées entières; fleurs jaunes, 2-7 en cymes terminales; calicule à lobes un peu plus courts que le calice; pétales émarginés, égalant ou dépassant peu le calice; carpelles glabres et lisses.*

Pâturages des hautes montagnes siliceuses: Hautes-Alpes et Savoie. — Piémont, Suisse, Laponie, Russie; Caucase, Sibérie, Daourie, Thibet. = Juin-août.

1125. — *P. pensylvanica* L. (*P. SANGUISORBIFOLIA* Wolf). — Plante vivace de 30-60 cm., velue-grisâtre, à souche épaisse; tiges raides, dressées, terminales, velues-soyeuses; *feuilles grandes, imparipennées, à 5-18 folioles oblongues en coin, poilues-grisâtres surtout en dessous, profondément dentées jusqu'à la base; stipules foliacées, souvent bipartites ou incisées; fleurs jaunes, en cymes rapprochées en panicule terminale; calicule à lobes aussi longs que le calice; pétales émarginés, égalant à peu près le calice; carpelles glabres, rugueux à la maturité.*

Isère, vallée de la Bérarde près de Saint-Christophe-en-Oisans. Naturalisé depuis longtemps aux environs de Paris. — Espagne; Piémont; Sibérie; Amérique du Nord. = Juin-août.