

- ✓ 1579. — **Bupleurum ranunculoides** L. — Plante vivace de 3-30 cm., à souche rameuse; tige souvent flexueuse, raide, feuillée dans toute sa longueur; feuilles sans nervure marginale, non en faux, les inférieures étroitement lancéolées ou linéaires, à 3-7 nervures, les caulinaires plus larges et embrassantes; ombelles à 4-10 rayons; involucre à 1-4 folioles lancéolées, inégales; involucelle à 5-6 folioles ovales ou elliptiques-lancéolées, jaunâtres, égalant à peine ou dépassant un peu les ombellules; fruit ovoïde, à côtes peu saillantes, aiguës; vallécules à 1-2 bandelettes. Polymorphe.

Rochers et pelouses des montagnes: Jura; Alpes, jusque dans la basse Provence; causses des Cévennes; Corbières et Pyrénées. — Europe centrale, d'Espagne à la Bosnie. = Juillet-septembre.




Bupleurum ranunculoides

- ✓ 1580. — **B. falcatum** L. — Plante vivace de 30-80 cm., à souche rameuse; tige flexueuse, dressée, feuillée, à rameaux étalés; feuilles pourvues d'une nervure marginale, souvent en faux, les inférieures ovales ou oblongues, à nervures peu saillantes, les supérieures linéaires-lancéolées, sessiles; ombelles à 4-10 rayons presque égaux; involucre à 1-4 folioles linéaires, inégales; involucelle à 5-6 folioles lancéolées ou linéaires, plus courtes que les ombellules; fruit ovoïde, à côtes saillantes; vallécules à 3-6 bandelettes. Polymorphe.

- ✓ Varie à feuilles inférieures linéaires-lancéolées, ombelles à rayons très inégaux (*B. tenuifolium* Pourr.; *B. gramineum* G. G.); tige creuse, involucre et involucelle à folioles longuement lancéolées (*B. corsicum* Coss.).


Bois et coteaux calcaires de toute la France; Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale. = Juillet-octobre.



Bupleurum falcatum

1581. — **B. rotundifolium** L. Oreille de lièvre. — Plante annuelle de 20-50 cm., glauque, à racine pivotante; tige dressée, rameuse dans le haut; feuilles perfoliées, traversées par la tige, largement ovales-suborbiculaires, obtuses, mucronulées, entourées d'une bordure transparente, à nervures rayonnantes; ombelles à 4-8 rayons courts; involucre nul; involucelle à folioles largement ovales, cuspidées, dépassant longuement l'ombellule, dressées après la floraison; fruit oblong, lisse, à côtes saillantes, sans bandelettes; carpophore indivis.

Moissons et champs cultivés des terrains calcaires, dans toute la France et en Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Juin-août. — Plante vulnérable et astringente.



Bupleurum rotundifolium

1582. — **B. protractum** Link et Hoffm. (*B. subovatum* Link). — Voisin du précédent. Plante annuelle de 20-30 cm.; tiges flexueuses, à rameaux divariqués et naissant dès la base; feuilles perfoliées, plus allongées, ovales-oblongues, sensiblement atténuées de la base au sommet, obtuses, mucronulées, à nervures rayonnantes saillantes; ombelles à 2-3 rayons; involucre nul; involucelle à folioles largement ovales, restant étalées après la floraison; fruit 1 fois plus gros, ovale, tuberculeux-granuleux, sans bandelettes.

Moissons des terrains calcaires, dans le Midi, l'Ouest et le Centre; Corse. — Europe méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Juin-août.



Bupleurum protractum