

TABLEAU DES ESPÈCES

Involucre et involucrelle à folioles nombreuses; ombelles fructifères à rayons presque égaux, étalés-dressés; feuilles à lanières capillaires courtes, comme verticillées; souche chevelue au sommet, à fibres radicales fasciculées. **C. verticillatum** 1597

Involucre et involucrelle nuls ou à 1-4 folioles; ombelles fructifères à rayons très inégaux, dressés et rapprochés; feuilles à lanières étroitement lancéolées-linéaires; racine nue, charnue, longuement pivotante. **C. Carvi** 1598

X 1597. — **Carum verticillatum** Koch (BUNIUM VERTICILLATUM G.G.). — Plante vivace de 30-60 cm., glabre et verte, à racine formée de fibres épaissies en masse, à souche chevelue; tige grêle, striée, peu rameuse, presque nue dans le haut; feuilles longues et étroites, bipennatiséquées, à lanières capillaires, courtes, très nombreuses, étalées et comme verticillées autour du pétiole; ombelles à 8-15 rayons filiformes, presque égaux, étalés-dressés; involucre et involucrelle à nombreuses folioles linéaires; styles 2 fois plus longs que le stylopede; fruit petit, ovoïde-oblong, non aromatique.

Prés et pâturages marécageux, dans les terrains sili-
ceux de presque toute la France. — Europe occidentale: Espagne et Portugal, Grande-Bretagne, Belgique et Pays-Bas, Allemagne occidentale. = Juin-septembre.



Carum verticillatum

✓ 1598. — **C. Carvi** L. (BUNIUM CARVI M.B.). Carvi. — Plante bisannuelle de 30-60 cm., glabre, à racine charnue, longuement pivotante en fuseau, nue au sommet, odorante; tige sillonnée anguleuse, rameuse souvent dès la base; feuilles oblongues, bipennatiséquées, à lanières linéaires, courtes, paraissant en croix sur le pétiole, les supérieures munies à la base de la gaine de 2 segments finement découpés; ombelles à 6-12 rayons très inégaux, dressés après la floraison; involucre et involucrelle nuls ou à 1-4 folioles; styles 1 fois plus longs que le stylopede; fruit ovoïde, aromatique.

Prés et bois, surtout montagneux, dans l'Est, le Centre et le Midi; nul dans tout l'Ouest. — Europe; Sibérie, Caucase, Perse, Thibet. = Mai-juillet. — Connue sous le nom d'Anis des Vosges, cette plante sert, dans cette région, à aromatiser les fromages.



Carum Carvi

Genre 299. — **ÆGOPIDIUM** L.

(Du grec *aix*, *aigos*, chèvre, *pous*, pied; allusion à la forme des feuilles.)

1 seule espèce.

1599. — **Ægopodium Podagraria** L. Herbe aux goutteux. — Plante vivace de 30-80 cm., glabre, à souche longuement rampante; tige robuste, creuse, cannelée, peu rameuse; feuilles inférieures longuement pétiolées, biternées, à folioles larges de 3-4 cm., ovales-lancéolées, aiguës, inégalement dentées en scie, les caulinaires sessiles sur la gaine et ternées; fleurs blanches, en ombelles à 12-20 rayons grêles presque égaux, la centrale seule fertile; involucre et involucrelle nuls; calice à limbe nul; pétales obovales, émarginés, à pointe courbée; styles réfléchis, 3 fois plus longs que le stylopede conique; fruit petit, ovoïde-oblong, comprimé par le côté, glabre; méricarpes à bords contigus, à 5 côtes filiformes égales; vallécules sans bandelettes; graine à face commissurale plane.

Lieux frais et ombragés, dans presque toute la France; très rare dans la région méditerranéenne. — Europe; Sibérie, Caucase et région pontique. = Mai-août. — Plante jadis très préconisée contre la goutte.



Ægopodium Podagraria