



Petroselinum sativum

- ✓ **1614. — Petroselinum sativum** Hoffm. *Parsil.* — Plante bisannuelle de 40-80 cm., glabre, luisante, aromatique; tige striée, rameuse; feuilles triangulaires dans leur pourtour, les inférieures bi-tripennatiséquées, à segments ovales en coin, incisés-dentés, les supérieures ordinairement à 3 segments entiers, lancéolés-linéaires; fleurs d'un vert jaunâtre, en ombelles longuement pédonculées, à 8-20 rayons étalés, presque égaux; involucre à 4-3 folioles linéaires; involucelle à folioles nombreuses, courtes; ombellules multiflores, à rayons égaux; styles réfléchis, plus longs que le stylopode courbe; fruit subglobuleux, aromatique.

Murs, rocailles, décombres, çà et là subspontané dans presque toute la France. — Spontané dans le Sud-Est de l'Europe, l'Asie occidentale, l'Afrique septentrionale. = Juin-septembre. — Cultivé partout.

Genre **308. — APIUM** L. — *Ache.*

(De *apion*, nom donné par les Grecs à diverses Ombellifères.)



Apium graveolens

- ✓ **1615. — Apium graveolens** L. — Plante bisannuelle de 30-80 cm., glabre, luisante, aromatique, à souche courte munie de fibres un peu charnues; tige creuse, sillonnée-anguleuse, très rameuse; feuilles un peu épaisses, les inférieures pennatiséquées, à segments ovales en coin, incisés-lobés, les supérieures à 3 segments plus petits et plus étroits; fleurs blanchâtres, en ombelles courtement pédonculées ou subsessiles, à 6-12 rayons inégaux; involucre et involucelle nuls; calice à limbe nul; pétales suborbiculaires en cœur, plans, entiers, à pointe un peu enroulée; stylopode déprimé; fruit petit, subglobuleux, presque didyme, comprimé par le côté, glabre; méricarpes à 5 côtes filiformes, égales, blanchâtres; vallécules à 1 bandelette.

Varie à racine charnue (*A. dulce* Mill., Céleri).

Marais salins des côtes de la Manche, de l'Océan, de la Méditerranée, et sources salines de l'intérieur. — Europe; Asie occidentale; Afrique; Amérique. — La variété cultivée partout. = Juillet-septembre.

Genre **309. — CICUTA** L. — *Ciguë.*

(Du grec *cicos*, force, puissance : allusion à ses propriétés vénéneuses.)

6 espèces habitant l'hémisphère boréal des deux mondes.



Cicuta virosa

- 1616. — Cicuta virosa** L. *Ciguë aquatique.* — Plante vivace d'environ 1 mètre, glabre, à racine grosse, creuse-cloisonnée, blanche, à odeur vireuse; tige robuste, creuse, striée, rameuse; feuilles intérieures à long pétiole tubuleux-cylindrique, bi-tripennatiséquées, à segments lancéolés-étroits, dentés en scie; fleurs blanches, en ombelles grandes, à 10-25 rayons allongés, égaux; involucre nul; involucelle à 3-5 folioles linéaires en alène; calice à 5 dents larges, aiguës, membraneuses; pétales obovales, émarginés, à pointe courbée; styles arqués, plus longs que le stylopode; fruit petit, plus large que long, subglobuleux, comprimé par le côté, glabre; méricarpes à 5 côtes égales, larges.

Marais tourbeux, dans le Nord, l'Est, le Centre et l'Ouest; nul dans les Alpes, les Pyrénées, la région méditerranéenne. — Europe centrale et boréale. = Juillet-août. — Plante très vénéneuse.