

1620. — *Anthriscus vulgaris* Pers. — Plante annuelle de 20-60 cm., fétide, à racine pivotante; tige faible, striée, glabre; feuilles molles, poilues, les inférieures tripennatiséquées, à segments pennatifides, à lobes courts, obtus-mucronés; ombelles sessiles ou courtement pédonculées, opposées aux feuilles, à 3-7 rayons grêles, glabres; involucre nul ou à 1 foliole; involucelle à 4-5 folioles lancéolées, étalées; styles courts, courbés-connivents; fruit court, ovoïde-aigu, couvert de petits aiguillons crochus, muni à la base d'un cercle de poils; bec glabre, anguleux, 3 fois plus court que les méricarpes.

Décombres, lieux incultes, dans presque toute la France; rare dans la région méditerranéenne; Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Mai-juin.



1621. — *A. Cerefolium* Hoffm. Cerfeuil cultivé. — Plante annuelle de 30-80 cm., aromatique, à racine pivotante; tige dressée, striée, épaissie et pubescente au-dessous des nœuds; feuilles luisantes, finement poilues, les inférieures bipennatiséquées, à segments ovales, pennatifidés, à lobes courts, obtus-mucronés; ombelles latérales, presque sessiles, opposées aux feuilles, à 3-5 rayons grêles, pubescents; involucre nul ou à 1-3 folioles; involucelle à 2-3 folioles lancéolées, réfléchies; styles courts, dressés, connivents; fruit linéaire-allongé, lisse, luisant, noir à la maturité; bec grêle, long de 3 mm., égalant la moitié des méricarpes.

Cultivé partout pour les usages culinaires, subspontané au voisinage des habitations. — Spontané dans l'Europe centrale et austro-orientale. = Mai-août.



1622. — *A. silvestris* Hoffm. Persil sauvage. — Plante vivace atteignant 1 mètre, glabre dans le haut, poilue inférieurement, fétide, à souche épaisse et allongée; tige creuse, cannelée, à nœuds un peu renflés; feuilles luisantes, les inférieures à pétiole égalant environ le limbe ou plus court, tripennatiséquées, à segments oblongs-lancéolés, rapprochés, subaigus; fleurs assez grandes, les extérieures rayonnantes; ombelles assez longuement pédonculées, terminales, à 7-16 rayons presque égaux; involucre nul, involucelle à 5 folioles lancéolées, réfléchies; styles étalés-dressés; fruit oblong-linéaire, lisse et luisant, à bec très court.

Varie à fleurs petites, non rayonnantes, stylopode conique (var. *ALPESTRIS* Gren.; *A. ALPINUS* Jord.).

Haies, prés et bois, dans toute la France. — Europe; Asie boréale et occidentale; Afrique septentrionale. = Mai-juillet.



1623. — *A. torquatus* (CHEROPHYLLUM TORQUATUM DC.). — Voisin du précédent. Plante vivace de 30-60 cm., glabre ou presque glabre, à souche tuberculeuse, ovoïde ou en navet; tige sillonnée, assez grêle; feuilles inférieures très longuement pétiolées, à limbe court égalant à peine la moitié de la longueur du pétiole, bipennatiséquées, à segments étroitement lancéolés ou linéaires, écartés, aigus; fleurs rayonnantes, les centrales avortées; ombelles à 7-10 rayons sensiblement inégaux; stylopode déprimé, non atténué au sommet; fruit oblong-linéaire, luisant, à bec très court.

Prairies élevées des Alpes: Haute-Savoie, Hautes-Alpes. — Suisse; Piémont. = Juin-juillet.

