

1134. — *Potentilla delphinensis* Gren. et G. — Plante vivace de 30-50 cm., tiges latérales, robustes, dressées dès la base, feuillées, à poils appliqués; feuilles digitées, les radicales longuement pétiolées, à 5 folioles obovales, vertes, à poils appliqués, dentées dans les deux tiers supérieurs, à dent terminale presque égale aux autres; les caulinaires à 5 folioles, à stipules allongées, lancéolées-acuminées; fleurs jaunes, grandes (25 mm. de diam.), en panicule serrée, à pédicelles courts; calicule à lobes aigus égalant presque le calice; pétales émarginés, 1 fois plus longs que le calice; carpelles un peu rugueux, étroitement bordés.

Rocailles et pâturages des Alpes; Isère, Hautes-Alpes. Espèce spéciale aux Alpes du Dauphiné. = Juin-août.



Potentilla delphinensis

1135. — *P. hirta* L. — Plante vivace de 10-30 cm., toute hérissée de longs poils blancs étalés; tiges terminales, étalées ou ascendantes, rougeâtres, feuillées; feuilles digitées, à 5-7 folioles obovales en coin, rétrécies dans leur moitié inférieure, souvent pliées en long, faiblement nervées, vertes, dentées dans le haut; stipules lancéolées entières; fleurs jaunes, grandes (23 mm.), en corymbe pauciflore, à pédicelles courts; calicule à lobes lancéolés, un peu plus courts que le calice; pétales émarginés, 1 fois plus longs que le calice; carpelles un peu rugueux, entourés d'une aile membraneuse.

Lieux secs et arides du Midi, jusque dans les Hautes-Alpes, la Drôme, l'Ardèche, l'Aveyron et le Lot. — Europe méridionale; Asie occidentale; Algérie. = Mai-juillet.



Potentilla hirta

1136. — *P. recta* L. — Plante vivace de 30-60 cm., velue, à inflorescence pourvue de poils longs et de courts poils glanduleux; tiges terminales, robustes, dressées, feuillées; feuilles digitées, à 5-7 folioles oblongues, planes, fortement nervées et plus pâles en dessous, profondément dentées tout autour; stipules souvent incisées; fleurs jaunes, grandes, en corymbe assez serré; calicule à lobes lancéolés égalant presque le calice; pétales émarginés, égalant ou dépassant le calice, carpelles rugueux, entourés d'un rebord membraneux.

Varie à inflorescence très hérissée, sans poils glanduleux (*P. PEDATA* Nestl.; *P. LETA* Reich.).

Lieux secs et arides, çà et là dans le Midi et le Centre jusqu'aux environs de Paris; Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale; Algérie. = Mai-juillet.



Potentilla recta

1137. — *P. inclinata* Vill. (*P. CANESCENS* Bess.). — Plante vivace de 20-60 cm., mollement velue-tomenteuse, tiges terminales, couchées à la base, ascendantes, très feuillées; feuilles digitées, à 5-7 folioles oblongues-lancéolées, rétrécies à la base, planes, vertes et pubescentes en dessus, grisâtres tomenteuses en dessous, profondément dentées tout autour; stipules souvent incisées-dentées; fleurs d'un jaune doré, moyennes, en corymbes assez serrés; calicule à lobes égalant à peu près le calice; pétales émarginés, dépassant peu le calice; carpelles obscurément bordés.

Lieux secs et arides de l'Est et du Midi, de l'Alsace aux Alpes-Maritimes, à l'Aveyron et aux Pyrénées-Orientales; naturalisé aux environs de Paris. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale. = Juin-juillet.



Potentilla inclinata