



Sambucus Ebulus



Sambucus nigra



Sambucus racemosa

✓ **1646. — Sambucus Ebulus L. Yèble.** — Plante vivace atteignant ou dépassant 1 mètre, glabre ou glabrescente, fétide, à souche rampante; tige herbacée, annuelle, robuste, sillonnée, pleine de moelle blanche, simple ou peu rameuse; feuilles à 7-11 folioles à peine pétioiculées, longuement lancéolées-acuminées, dentées; stipules foliacées, ovales, inégales; fleurs blanches ou rougeâtres en dehors, odorantes, disposées en large corymbe plan, à 3 branches principales; corolle à lobes ovales-aigus; anthères rouges ou violacées; baies noires à la maturité.

Terrains incultes frais, surtout argilo-calcaires, dans toute la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale, jusqu'en Perse; Afrique septentrionale. = Fl. juin-août, fr. septembre-octobre. — Plante envahissante et nuisible; les baies servent fréquemment à colorer les vins et sont purgatives.

✓ **1647. — S. nigra L. Sureau noir.** — Arbrisseau ou arbuste de 2 à 6 mètres, à rameaux ligneux, verruqueux-grisâtres, remplis d'une moelle blanche, les jeunes brièvement hispides; feuilles à 5-7 folioles pétioiculées, ovales-acuminées, dentées; stipules nulles ou très petites; fleurs blanches, un peu jaunâtres par la dessiccation, très odorantes, disposées en large corymbe plan à 5 branches principales, paraissant après les feuilles; corolle à lobes ovales-arrondis; anthères jaunes; baies noires (rarement blanchâtres) à la maturité.

Varie à folioles pennatiséquées, à lanières étroites (S. LACINIATA Mill.).

Bois, haies, ruisseaux, dans presque toute la France et en Corse. — Europe; Caucase et région pontique; subspontané en Algérie. = Fl. juin, fr. septembre. — Les fleurs sont employées en infusion comme sudorifiques; l'écorce et les baies sont purgatives.

✓ **1648. — S. racemosa L. Sureau rouge.** — Arbrisseau de 2-4 mètres, à rameaux ligneux, verruqueux-grisâtres, à moelle jaunâtre; feuilles à 5-7 folioles pétioiculées, oblongues-acuminées, dentées; stipules représentées par de grosses glandes stipitées; fleurs d'un blanc jaunâtre, peu odorantes, en thyrses ou panicules ovoïdes denses, terminant les rameaux latéraux et paraissant avec les feuilles; baies d'un rouge corail à la maturité.

Bois des montagnes, surtout dans la zone du hêtre et du sapin; nul dans l'Ouest et la région méditerranéenne. — Europe, surtout centrale; Sibérie; Amérique septentrionale. = Fl. avril-mai, fr. juillet-septembre. — Souvent planté dans les bosquets; dans les Vosges, on retire de l'alcool de ses fruits.

### Genre 328. — VIBURNUM L. — Viorne.

(Du latin *viere*, lier : allusion à la souplesse et aux usages des rameaux de la Mancienne.)

Calice à 5 dents courtes; corolle en cloche ou en roue, à 5 lobes égaux ou inégaux; 5 étamines; style nul, 3 stigmates sessiles; baie à 1 seule loge et à 1 seule graine.

Fleurs blanches ou rosées, en corymbes terminaux, rameux, à 6-7 branches principales; feuilles simples, entières, dentées ou lobées, stipulées ou non; arbrisseaux dressés, à rameaux opposés.

Environ 80 espèces habitant les régions tempérées et tropicales de tout le globe.