



✓ 1656. — *Lonicera Xylosteum* L. *Camérisier*. — Sous-arbrisseau de 1-2 mètres, dressé, à jeunes rameaux pubescents; feuilles toutes pétiolées, mollement pubescentes, surtout en dessous, ovales, aiguës ou mucronées; pédoncules axillaires, velus, égalant les fleurs; fleurs géminées, d'un blanc jaunâtre, inodores; bractées linéaires, plus longues que l'ovaire; corolle velue, à 2 lèvres, à tube très court, bossu à la base; filets des étamines et style velus; baies géminées, à peine soudées à la base, globuleuses, rouges.

Haies et bois, surtout dans l'Est et le Centre; rare dans l'Ouest et la région méditerranéenne. — Presque toute l'Europe; Caucase et région pontique; Sibérie. — Mai-juin. — Les rameaux servent à faire des balais.



✓ 1657. — *L. caerulea* L. — Sous-arbrisseau atteignant rarement 1 mètre, dressé, à jeunes rameaux hérissés; feuilles brièvement pétiolées, un peu velues en dessous, ovales-oblongues, obtuses; pédoncules axillaires, velus, 2-4 fois plus courts que les fleurs; fleurs géminées, d'un blanc jaunâtre, inodores; bractées linéaires, 2 fois plus longues que l'ovaire; corolle velue, presque régulière, en cloche, à tube égalant le limbe; filets des étamines pubescents à la base; style glabre; baies soudées et confondues en une seule subglobuleuse, glauque, d'un noir bleuâtre.

Tourbières, bois et rochers des hautes montagnes: Haut-Jura; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — Europe centrale et boréale; Caucase, Sibérie; Amérique boréale. — Mai-juillet.



✓ 1658. — *L. pyrenaica* L. — Sous-arbrisseau atteignant rarement 1 mètre, dressé, à rameaux fragiles, blanchâtres, glabres; feuilles atténuées en un très court pétiole, petites, oblongues, un peu coriaces, glabres, glauques, à nervures transparentes; pédoncules axillaires, glabres, égalant à peu près les fleurs; fleurs géminées, d'un blanc à peine rosé, odorantes; bractées lancéolées-aiguës, un peu plus courtes que l'ovaire, corolle glabre, presque régulière, en cloche, à tube à peine bossu à la base, plus long que le limbe; étamines glabres; style velu à la base; baies géminées, à peine soudées à la base, globuleuses, rouges.

Rochers, surtout calcaires, de toute la chaîne des Pyrénées; Corbières. — Espagne septentrionale; Baléares. — Mai-juillet.



✓ 1659. — *L. nigra* L. — Sous arbrisseau de 1 à 2 mètres, dressé, à rameaux bruns, glabres; feuilles brièvement pétiolées, oblongues-elliptiques, glabres ou glabrescentes, à nervures opaques; pédoncules axillaires, glabres, 3-4 fois plus longs que les fleurs; fleurs géminées, d'un blanc rosé; bractées ovales, plus courtes que l'ovaire; corolle glabrescente, à 2 lèvres, à tube bossu à la base, plus court que le limbe; filets des étamines et style velus à la base; baies géminées, à peine soudées à la base, subglobuleuses, noires.

Bois et rocailles des montagnes: Vosges; Jura; Beaujolais et Bugey; Alpes; Forez, Auvergne, Cévennes; Corbières et Pyrénées. — Europe centrale, d'Espagne en Russie; Asie boréale. — Mai-juillet.