

- Pédicelles à poils appliqués; fleurs moyennes (12-15 mm.); calice fructifère étalé ou réfléchi; fruit élargi et pourvu de carpelles à la base; folioles assez grandes, les latérales sessiles **F. vesca** 1149
- Pédicelles à poils appliqués ou peu étalés; fleurs assez grandes (15-20 mm.); calice appliqué sur le fruit rétréci et sans carpelles à la base; folioles assez petites, sessiles ou pétiolulées **F. collina** 1150

1148. — *Fragaria elatior* Ehrh. (F. MAGNA Thuill.).
Caperonnier. — Plante robuste de 10-40 cm.; stolons nuls ou peu nombreux, munis d'une écaille dans l'intervalle des nœuds feuillés; tiges dépassant les feuilles, très velues, nues ou à 1-2 feuilles florales; feuilles grandes, à trois folioles ovales, pubescentes, d'un blanc soyeux en dessous, largement dentées, toutes brièvement pétiolulées; pédicelles couverts de poils serrés très étalés; fleurs grandes (20-25 mm. de diam.), souvent stériles; calice étalé ou réfléchi sous le fruit; fruit ovoïde, rougeâtre, rétréci et dépourvu de carpelles à la base, adhérent au calice.

Haies et bois, dans le Nord, l'Est et le Centre; nul dans l'Ouest et le Midi. — Europe centrale et orientale; Sibérie, région de l'Amour, Japon. = Avril-juin.

1149. — *F. vesca* L. *Fraisier des bois.* — Plante grêle, de 5-25 cm.; stolons nombreux, allongés, munis d'une écaille dans l'intervalle des nœuds feuillés; tiges dépassant peu ou point les feuilles, velues, nues ou portant 1-2 feuilles florales; feuilles assez grandes, à 3 folioles ovales, pâles-pubescentes ou subsoyeuses en dessous, largement dentées, toutes ou les latérales sessiles; pédicelles un peu épais, couverts de poils appliqués; fleurs blanches, moyennes (12-15 mm. de diam.), très fertiles; calice fructifère étalé ou réfléchi; fruit ovoïde ou globuleux, rouge, rarement blanc, plus large à la base, entièrement garni de carpelles, non adhérent au calice.

Bois, haies, buissons, dans presque toute la France et en Corse. — Europe; Asie; Afrique septentrionale; Amérique du Nord et du Sud. = Avril-juin.

1150. — *F. collina* Ehrh. *Breslinge.* — Plante grêle, de 5-20 cm.; stolons nuls ou peu nombreux, dépourvus d'écaille dans l'intervalle des nœuds feuillés; tiges dépassant peu ou point les feuilles, très velues, nues ou à 1-2 feuilles florales; feuilles assez petites, à 3 folioles ovales, très blanches-soyeuses en dessous, dentées, subsessiles; pédicelles grêles, à poils appliqués ou un peu étalés; fleurs blanches ou légèrement jaunâtres, assez grandes (15-20 mm.); calice redressé après la floraison et appliqué sur le fruit rétréci et sans carpelles à la base, subglobuleux, rouge ou blanchâtre, très adhérent au calice.

Varie à folioles toutes pétiolulées, la terminale longuement, stolons munis d'une écaille (F. HAGENBACHIANA Lang.).

Bois et coteaux, surtout calcaires, dans presque toute la France. — Europe; Caucase et Sibérie; Canaries. = Mai-juin.



Fragaria elatior



Fragaria vesca



Fragaria collina