

Têtes florales ovales, longues de 5-7 cm. ; folioles de l'involucre arquées-ascendantes ; paillettes du réceptacle toutes semblables et plus courtes que la tête florale ; feuilles faiblement aiguillonnées.

Feuilles garnies de soies raides sur toute leur surface, la plupart pennatifides, les moyennes largement connées en godet ; folioles de l'involucre lancéolées en alène ; fleurs blanchâtres ou un peu rosées **D. laciniatus** 1752

Feuilles garnies d'aiguillons sur la nervure dorsale et sur les bords, entières, dentées ou un peu sinuées, les moyennes moins largement connées ; folioles de l'involucre linéaires en alène ; fleurs d'un rose lilas **D. silvestris** 1753

✓ 1749. — **Dipsacus pilosus** L. (CEPHALARIA PILOSA Gren. et G.). *Verge à pasteur*. — Plante bisannuelle de 1 à 2 mètres, à tige creuse, sillonnée, hérissée de fins aiguillons qui passent à des soies raides garnissant le bas des tiges et les pédoncules ; feuilles ovales ou oblongues-acuminées, dentées, toutes pétiolées, faiblement aiguillonnées sur la nervure dorsale, munies à la base du limbe de 2 petits segments inégaux ; fleurs d'un blanc jaunâtre, en têtes globuleuses de 2 cm. de diam., d'abord penchées, puis dressées ; folioles de l'involucre à la fin réfléchies, lancéolées-linéaires, un peu plus longues mais peu différentes des paillettes, comme elles spinescentes et hérissées de longues soies étalées.


Lieux frais et ombragés, dans une grande partie de la France ; nul dans la région méditerranéenne. — Europe, surtout centrale ; Asie occidentale, Mongolie et Japon. = Juin-septembre.



Dipsacus pilosus

1750. — **D. fullonum** Mill. *Chardon à foulon*. — Plante bisannuelle d'environ 1 mètre, à tige robuste, creuse, sillonnée, faiblement épineuse ; feuilles inermes ou munies de rares aiguillons, les radicales oblongues, les caulinaires connées, entières ou dentées ; fleurs d'un rose lilas, en têtes ovales-cylindracées de 4-6 cm. de long sur 3 de large ; folioles de l'involucre étalées, lancéolées-linéaires, raides, plus courtes que la tête florale ; paillettes du réceptacle égalant presque les fleurs, pubescentes-scabres, brusquement terminées en pointe courbée en dehors.


Espèce jadis cultivée en grand et subspontanée çà et là dans une grande partie de la France et de l'Europe. — Origine spontanée incertaine. = Juin-août. — Servait au cardage des laines.



Dipsacus fullonum

1751. — **D. ferox** Lois. — Plante bisannuelle de 20-50 cm., à tige robuste, creuse, sillonnée, densément épineuse ; feuilles couvertes sur les 2 faces d'aiguillons forts et jaunâtres, les radicales crénelées-sinuées, les caulinaires connées, pennatifides ; fleurs blanchâtres ou lilacées, en têtes subglobuleuses de 4 cm. de long ; folioles de l'involucre étalées, aiguillonnées, dépassant la tête florale ; paillettes supérieures semblables aux folioles de l'involucre et aussi longues que la tête florale, les autres brusquement acuminées, plus longues que les fleurs.

Lieux humides et pierreux de la région basse et moyenne de la Corse. — Sardaigne, Italie, Espagne et Portugal. = Juin-juillet.



Dipsacus ferox