

Fleurs jaunes ou blanches, en têtes globuleuses, assez grandes (2-3 cm.) ; folioles de l'involucré et paillettes du réceptacle non aristées ; plantes vivaces, pubescentes ou glabres, lisses.

Fleurs jaunes, en têtes un peu penchées ; folioles de l'involucré et paillettes du réceptacle herbacées, lancéolées-acuminées ; calicule enveloppant le limbe du calice ; corolle à lobes égaux ; plante toute velue-soyeuse. . . . *C. alpina* 1756

Fleurs blanches, en têtes dressées ; folioles de l'involucré et paillettes du réceptacle scarieuses, obtuses ou subaiguës ; calicule atteignant la base du limbe du calice ; corolle à lobes un peu inégaux ; plante glabrescente . . . . *C. leucantha* 1757

**1754. — *Cephalaria syriaca* Schrad.** — Plante annuelle de 20-40 cm., à racine pivotante, à tige grêle, raide, anguleuse, hérissée-scabre ; feuilles simples, oblongues-lancéolées, entières ou dentées, ciliées, les caulinaires connées à la base ; fleurs d'un bleu pâle ou lilas, en têtes ovoïdes, petites (1 cm. environ), dressées ; folioles de l'involucré et paillettes du réceptacle scarieuses, obovales, brusquement terminées en arête pi-quante aussi longue que leur limbe et que les fleurs ; calicule à 8 dents en alène, inégales, les 4 plus longues dépassant le limbe velu du calice ; corolle à lobes égaux ; étamines saillantes, à anthères rougeâtres.

Moissons et lieux cultivés du Midi : Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, où il est rare. — Espagne, Ligurie, Chypre, Russie méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale. = Juin-juillet.



*Cephalaria syriaca*

**1755. — *C. transylvanica* Schrad.** — Plante annuelle de 30-80 cm., à racine pivotante, à tige grêle, raide, striée, plus ou moins hérissée-scabre ; feuilles hispides, les caulinaires lyrées ou pennatiséquées, à segments lancéolés-linéaires, le terminal plus grand ; fleurs d'un bleu pâle, en têtes ovoïdes, petites (1 cm. de diam.), dressées ; folioles de l'involucré et paillettes du réceptacle scarieuses, ciliées, ovales-acuminées, à arête plus courte que leur limbe et que les fleurs ; calicule à 8 dents égales, courtes, n'atteignant pas la base du limbe velu du calice ; corolle à lobes extérieurs plus grands, rayonnants ; anthères saillantes, purpurines.

Champs et terres incultes du Midi : Var, Alpes-Maritimes, Tarn. — Europe méridionale et orientale ; Asie Mineure, Caucase. = Août-septembre.



*Cephalaria transylvanica*

**1756. — *C. alpina* Schrad.** — Plante vivace de 1 à 2 mètres, toute velue-soyeuse, à tige sillonnée-anguleuse, lisse, creuse ; feuilles pubescentes, les caulinaires pennatiséquées, à 9-13 segments lancéolés, dentés, le terminal plus grand ; fleurs jaunes, en têtes globuleuses, assez grandes (2-3 cm.), un peu penchées ; folioles de l'involucré et paillettes du réceptacle herbacées, velues-soyeuses, lancéolées-acuminées, plus courtes que les fleurs ; calicule à 8 dents sétacées, enveloppant le limbe velu du calice ; corolle à lobes égaux ; anthères saillantes, brunes.

Paturages et rocallies des hautes montagnes : Chaîne du Jura ; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence. — Suisse ; Italie septentrionale. = Juillet-août.



*Cephalaria alpina*