

✓ 1758. — *Knautia hybrida* Coult. — Plante annuelle de 30-60 cm., velue-rude, à racine grêle, pivotante; feuilles inférieures en rosette, oblongues, lyrées ou pennatifides, les supérieures lancéolées-linéaires, entières; pédoncules poilus-glanduleux; fleurs d'un rose pâle ou lilas, les extérieures très rayonnantes, en têtes presque planes; involucre à 8-12 folioles lancéolées-acuminées, ciliées, plus courtes que les fleurs, plus longues que les fruits; calicule terminé par 2 réunions de dents inégales; calice en coupe couronnée de nombreuses soies blanches plus courtes que le calicule.

Champs cultivés et coteaux du Midi : Languedoc; Provence; Corse. — Europe méditerranéenne; Asie Mineure, Syrie, Palestine. = Mai-juin.

*Knautia hybrida*


1759. — *K. collina* Gren. et G. (*K. SUBSCAPOSA* Boiss.). — Plante vivace de 20-50 cm., velue-grisâtre, à souche épaisse, courte, oblique; feuilles grisâtres-tomentueuses ou soyeuses, presque toutes radicales, ordinairement lyrées ou pennatifides, à lobes souvent oblongs-obtus, les rares caulinares pennatifides; pédoncules densément couverts de poils glanduleux courts entremêlés de poils simples longs et moins nombreux; fleurs roses, les extérieures rayonnantes, en têtes hémisphériques; involucre à folioles lancéolées, plus courtes que les fleurs; calice à limbe stipité, à 8 dents lancéolées-aristées, égalant les 2/3 du calicule.

Coteaux secs et arides du Midi; remonte jusque dans les Hautes-Alpes, la Lozère et l'Aveyron. — Espagne, Italie, Istrie, Dalmatie; Algérie. = Juin-juillet.

*Knautia collina*

✓ 1760. — *K. arvensis* Koch (*TRICHERA ARVENSIS* Schrad.). *Scabiéuse*. — Plante vivace de 20-80 cm., velue, à souche épaisse et oblique; feuilles d'un vert terne et grisâtre, les inférieures entières, dentées ou pennatifides, à lobes lancéolés-linéaires, aigus, les moyennes ordinairement pennatiséquées; pédoncules non ou peu glanduleux, hérissés de poils longs, entremêlés d'un duvet court et crépu; fleurs roses ou lilas, les extérieures rayonnantes, en têtes hémisphériques; involucre à folioles lancéolées, plus courtes que les fleurs; calice à limbe stipité, à 8 dents en arête, égalant les 2/3 de la longueur du calicule. Polymorphe.

Champs, prés et coteaux, dans toute la France et en Corse. — Toute l'Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Juin-août. — Plante amère et détersive.

*Knautia arvensis*

✕ 1761. — *K. silvatica* Duby (*K. DIPSACIFOLIA* Host.). — Plante vivace atteignant souvent 1 mètre, ordinairement velue surtout à la base, à souche épaisse; feuilles d'un vert clair, plus ou moins poilues, oblongues-lancéolées, acuminées, dentées ou presque entières, à nervures saillantes; pédoncules velus ou pubescents; fleurs roses ou lilas, les extérieures à peine rayonnantes, en têtes hémisphériques; involucre à folioles lancéolées, acuminées, presque aussi longues que les fleurs; calice à limbe subsessile, à dents lancéolées-aristées, égalant la moitié du calicule. Polymorphe.

Lieux frais et ombragés des montagnes de l'Est, du Centre, du Midi et dans le Sud-Ouest. — Europe centrale et méridionale. = Juin-septembre.

*Knautia silvatica*