



Scabiosa columbaria

1772. — *Scabiosa columbaria* L. — Plante vivace de 30-80 cm., plus ou moins poilue, à tiges ordinairement rameuses, à rameaux étalés; feuilles pubescentes ou velues; les radicales crénelées ou incisées-lyrées, les caulinaires ordinairement pennatiséquées, à paires presque également distantes; fleurs d'un bleu clair, rayonnantes; involucre à environ 10 folioles linéaires, plus courtes que les fleurs; têtes fructifères assez grandes, ovoïdes-subglobuleuses; calicule poilu, parcouru par 8 sillons; arêtes calicinales noirâtres, sétacées dès la base et sans nervure, 3-4 fois plus longues que la couronne.

Près et cotéaux secs, dans presque toute la France. — Europe; Asie Mineure, région Pontique et Caucase; Afrique septentrionale. = Juin-octobre.



Scabiosa pyrenaica

1773. — *S. pyrenaica* All. (*S. vestita* et *S. velutina* Jord.). — Plante vivace de 20-50 cm., tomenteuse, à rameaux rares et dressés-étalés; feuilles densément et brièvement tomenteuses-blanchâtres, les radicales crénelées ou incisées, les caulinaires rapprochées, pennatiséquées, à segment terminal plus grand; fleurs d'un beau bleu lilas, grandes, rayonnantes; involucre à 10-13 folioles linéaires-lancéolées, égalant presque les fleurs; têtes fructifères assez grandes, globuleuses-déprimées; calicule poilu, creusé de 8 sillons; arêtes calicinales noirâtres, obscurément nervées à la base, environ 3 fois plus longues que la couronne.

Pâturages élevés et cotéaux pierreux des montagnes: Chaîne des Pyrénées; Alpes de la Provence. — Espagne septentrionale; Italie septentrionale et centrale. = Juillet-septembre.



Scabiosa lucida

1774. — *S. lucida* Vill. — Plante vivace de 40-30 cm., presque glabre, à tiges simples ou à 1-2 rameaux; feuilles glabres ou finement pubescentes, vertes, plus ou moins luisantes, les inférieures crénelées ou incisées, les caulinaires rapprochées vers la base, pennatiséquées, à segments profonds et étroits; fleurs d'un rose lilas, rayonnantes; involucre à 10-13 folioles plus courtes que les fleurs; têtes fructifères globuleuses; calicule poilu, creusé de 8 sillons; arêtes calicinales noirâtres, élargies à la base et marquées en dessus d'une nervure saillante, 3-4 fois plus longues que la couronne du calicule.

Pâturages et bois des montagnes: Hautes Vosges, haut Jura; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — Europe centrale. = Juillet-septembre.

FAMILLE 63. — COMPOSÉES (SYNANTHÉRÉES).

La famille des COMPOSÉES a été rédigée par M. A. Le Grand, membre de la Société botanique de France.

Fleurs régulières ou irrégulières, hermaphrodites, unisexuées ou neutres, sessiles et réunies sur un réceptacle commun en capitules entourés d'un involucre ou péricline, celui-ci composé de folioles herbacées ou épineuses, souvent disposées sur plusieurs rangs, les extérieures ordinairement plus courtes que les intérieures; réceptacle nu ou pourvu de bractéoles (écailles, paillettes), presque toujours persistantes; calice monosépale à limbe formé par des poils ou soies, des arêtes, quelquefois par des écailles couronnant l'ovaire, rarement nul; corolle monopétale tantôt tubuleuse (fleuron), régulière