

Fleurs discolores, celles du centre jaunes, celles de la circonférence à ligules blanches, rarement purpurines.

- LEUCANTHEMUM** (p. p.) 382
- < Réceptacle allongé, conique à la maturité. . . **MATRICARIA** 383
- ✓ Réceptacle garni d'écailles (paillettes); achaines dépourvus d'aigrette de soies capillaires, mais parfois surmontés de quelques arêtes épineuses.
- ♣ Feuilles alternes; achaines dépourvus d'arêtes épineuses terminales.
- ✓ Fleurs de la circonférence ligulées, rayonnantes.
- ✚ Ligules à limbe suborbiculaire. **ACHILLEA** 389
- ✚ Ligules à limbe oblong ou elliptique.
- + Feuilles plus ou moins profondément découpées.
- ♂ Achaines privés d'ailes membraneuses.
- Réceptacle s'allongeant et devenant conique à la maturité; achaines subcylindriques ou légèrement tétragones . . . **ANTHEMIS** 384
- Réceptacle convexe ne s'allongeant pas en cône; achaines comprimés, tétragones **COTA** 385
- ♂ Achaines très comprimés, plans, les extérieurs très largement ailés, à ailes auriculées de chaque côté au sommet.
- ANACYCLUS** (p. p.) 386
- + Feuilles entières ou seulement denticulées.
- Folioles de l'involucre appliquées, presque égales; achaines non ou peu comprimés trigones **BUPHTHALMUM** 390
- Folioles extérieures de l'involucre étalées bien plus longues que les intérieures; achaines fortement comprimés. . . **ASTERISCUS** 391
- ✓ Toutes les fleurs tubuleuses ou à ligules très courtes, peu apparentes.
- Feuilles oblongues, entières ou faiblement crénelées; fleurs à tube ailé, à ailes prolongées jusque vers la base de l'ovaire; plante couverte d'un épais tomentum **DIOTIS** 387
- Feuilles linéaires ou oblongues, régulièrement pennatifides ou pennatipartites; tube des fleurs dilaté à la base en forme de coiffe. **SANTOLINA** 388
- Feuilles bipennatiséquées; achaines extérieurs ornés d'une aile large, très mince, hyaline **ANACYCLUS** (p. p.) 386
- ♣ Feuilles opposées; achaines portant au sommet 2-3 arêtes épineuses.
- Achaines triangulaires; feuilles simples ou à 3-5 segments dentés.
- BIDENS** 392
- Achaines linéaires, très étroits; feuilles pennatiséquées. . . **KERNERIA** 393

Genre 344. — **EUPATORIUM** Tourn. — *Eupatoire*.

(*Eupator*, surnom du roi Mithridate.)

Capitules cylindriques-oblongs, pauciflores; involucre à folioles peu nombreuses, lâchement imbriquées; fleurs toutes tubuleuses à corolle régulièrement dilatée de la base au sommet; soies de l'aigrette sur un seul rang; réceptacle nu.



Eupatorium cannabinum

1775. — *Eupatorium cannabinum* L. *Eupatoire à feuilles de chanvre*. — Plante vivace de 6-12 dm. à tige dressée, simple ou rameuse, souvent rougeâtre, pubescente; feuilles opposées à 3-5 segments pétiolulés, lancéolés, dentés (quelquefois les supérieures simples), glanduleuses en dessous; involucre à folioles intérieures scariées, oblongues-linéaires, très obtuses, les extérieures ovales; capitules purpurins, en corymbe rameux, terminal, compact.

Varie (en Corse) à segments des feuilles plus courts, à dents obtuses, à capitules plus petits, à aigrette à peine plus longue que l'achaine (*E. corsicum* Req.).

Bois et lieux humides, bords des eaux, marais dans toute la France, Corse. — Europe, Asie Mineure, Afrique septentrionale. = Juillet-août.