Genre 346. - PETASITES Tourn.

(Du grec petasos, chapeau, parasol, allusion à la forme des feuilles.)

TABLEAU DES ESPÈCES.

O Toutes les fleurs tubuleuses ; feuilles se développant avant les fleurs.

Verilles couvertes en dessous d'un épais tomentum d'un beau blanc de neige.

P. niveus 1780

Feuilles dépourvues d'épais tomentum, seulement pubescentes ou un peu tomenteuses en dessous, à parenchyme très apparent.



Petasites fragrans



Petasites albus

1779. — Petasites fragrans Presl. (Nardosmia fragrans Rchb.). — Plante vivace de 15-30 cm. à fige dressée, simple, pourvue de quelques écailles parfois foliiformes; feuilles toutes radicales apparaissant en même temps que les fleurs, pétiolées, vertes sur les deux faces, glabres en dessus, un peu pubescentes en dessous, à limbe orbiculaire bordé de dents fines et régulières, profondément cordé; capitules d'un violet très clair en grappe courte et làche; corolles de la circonférence brièvement ligulées. Odeur de vanille.

Lieux humides de la région méditerranéenne: Alpes-Maritimes, Var, Pyrénées-Orientales; souvent adventice. — Italie, Sardaigne, Sicile, Afrique septentrionale. = Janvier-mars.

1780. — P. niveus Baumg. — Plante vivace de 2-6 dm. à tige dressée, pourvue d'écailles foliacées demi-embrassantes, celles de la grappe lancéolées-linéaires; feuilles toutes radicales paraissant après les fleurs, pétiolées, tomenteuses et d'un blanc de neige en dessous, à tomentum épais ne laissant pas voir le parenchyme, à limbe sinué-denté, subtriangulaire, cordé; fond de l'échancrure de la feuille bordé par une forte nervure; capitules à fleurs blanches ou d'un rose pâle en grappe ovoïde.

Rochers, bords des torrents des hautes montagnes : Jura, Savoie, Dauphiné, Provence, Alpes-Maritimes. — Europe centrale, Russie. = Avril-mai.

1781. — P. albus Gærtn. — Plante vivace de 2-3 dm. à tige dressée, simple, garnie de longues écailles foliacées, demi-embrassantes, celles de la grappe lancéolées-linéaires; feuilles toutes radicales, paraissant après les fleurs, pétiolées, d'abord blanches-tomenteuses en dessous, puis plus pâles, à limbe fortement anguleux, sinué-denté, réniforme ou surborbiculaire, cordé; échancrure du limbe non limitée par une nervure, mais continuée par le parenchyme; capitules à fleurs blanches ou un peu jaunâtres en grappe courte, ovale ou subglobuleuse.

Lieux humides, rochers des montagnes: Vosges, Jura, Bugey, Savoie, Haute-Savoie, Dauphiné, Alpes-Maritimes, Plateau central. — Suisse, Italie, Allemagne, Autriche, Russie. — Avril-mai.