Genre 355. - ASTER L.

(Du grec astér, étoile ; les fleurs sont étoilées.)

Réceptacle alvéolé à alvéoles pourvues d'un rebord denté.

TABLEAU DES ESPÈCES

🚣 Capitules toujours solitaires au sommet des tiges A. alpinus 1801

Capitules en corymbe.

> Tiges et feuilles charnues; plante lisse et glabre propre aux terrains salés.

A. Tripolium 1803

> Feuilles fermes ou raides, non charnues, plantes des terrains secs non salés.

Peuilles oblongues-lancéolées ou elliptiques, pubescentes sur les deux faces ainsi que la tige; corymbe court, lâche et peu fourni. A. amellus 1802

Feuilles linéaires ou sublinéaires, fermes et raides, glabres ou presque glabres ainsi que la tige; corymbe très compact.

A. trinervis 1805

Capitules disposés en large grappe pyramidale ou en vaste panicule décomposée garnie de feuilles; tiges d'au moins 1 mètre.

Feuilles embrassantes et auriculées à la base ou au moins demi-embrassantes; capitules en grappe oblongue très fournie et très feuillée. A. brumalis 1806 Feuilles linéaires-lancéolées ou linéaires non embrassantes, atténuées à la base; capitules en large panicule composée A. salignus 1807

1800. — Aster pyrenaeus DC. Aster des Pyrénées. — Plante vivace de 4-6 dm., à tige dressée, simple, pubescente-hispide; feuilles sessiles, pubescentes-rudes, oblongues-lancéolées, aiguës, trinervées, dentées dans leur moitié supérieure, embrassant à leur base la moitié de la tige au moins par deux oreillettes, les supérieures entières; involucre à folioles lâches, hispides, étroitement lancéolées, acuminées, très aiguës, les extérieures à pointe arquée en dehors; capitules grands, 5 cm. environ de diamètre, solitaires ou 2-5 terminaux; fleurs de la circonférence à longues ligules bleu-lilas, celles du centre tubuleuses, jaunes.

Pyrénées centrales et occidentales. — Catalogne; très rare. — Août-septembre.

1801.— A. alpinus L. Aster des Alpes. — Plante vivace de 6-25 cm., à tige dressée, simple, pubescente; feuilles très entières, pubescentes, les inférieures oblongues-obovales ou spatulées, pétiolées, trinervées, les suivantes lancéolées-oblongues, obtuses, atténuées à la base, les supérieures aiguës; involucre à folioles làches, velues, lancéolées, obtuses, les intérieures apiculées; aigrette d'un blanc sale, à soies deux fois plus longues que l'achaine; capitule grand, 35-45 mm. de diamètre, toujours solitaire, terminal; ligules de la circonférence violettes ou d'un bleu lilas, fleurs du centre tubuleuses, jaunes.

Rochers, păturages des montagnes : Jura, Savoie, Dauphiné, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Cévennes, Lozère, Aveyron, Gard, Hérault, Pyrénées. = Juin-août.



