



Aster Amellus



Aster Tripolium



Aster acris



Aster trinervis

1802. — Aster amellus L. — Plante vivace de 15-30 cm., à tige dressée, simple ou rameuse au sommet, brièvement pubescente; *feuilles pubescentes, rudes* sur les deux faces, trinervées, ordinairement très entières, les *inférieures ovales-oblongues ou elliptiques*, atténuées en pétiole, les suivantes sessiles, oblongues-lancéolées, aiguës; involucre à folioles velues, oblongues, les *extérieures très obtuses à sommet recourbé en dehors*; soies de l'aigrette roussâtres, à peine une fois plus longues que l'achaine; *capitules* de 3 cm. environ de diamètre, au nombre de 2-6 en *corymbe court et lâche*, rarement un seul capitule terminal; ligules bleues, fleurs du centre tubuleuses jaunes.

Bords des bois, pelouses des coteaux calcaires ou basaltiques : presque toute la France, sauf l'Ouest et le Nord. — Europe centrale, Russie, Asie occidentale. = Août-septembre.

1803. — A. Tripolium L. — Plante bisannuelle de 2-6 dm., à tige simple ou rameuse dès la base, dressée ou ascendante, *glabre*; *feuilles charnues, très glabres*, les radicales oblongues-ovales, longuement pétiolées, les caulinaires oblongues-lancéolées, ou lancéolées-linéaires; involucre à *folioles glabres, ciliolées* au sommet; soies de l'aigrette blanches; capitules de 2 cm. environ de diamètre en panicule corymbiforme, à pédicelles pourvus de quelques bractéoles; ligules (manquant parfois par avortement) violettes, blanches ou d'un blanc-lilas, fleurs du centre tubuleuses, jaunes.

Prés maritimes, marais salés : littoral de la Méditerranée, de l'Océan, de la Manche; Corse; marais salants de la Lorraine. — Tout le littoral européen, Afrique septentrionale. = Juillet-octobre.

1804. — A. acris L. — Plante vivace de 2-5 dm., à tige dressée, raide, striée, glabre ou presque glabre, rameuse au sommet, très feuillée; *feuilles pourvues de ramuscules à leur aisselle, fortement ponctuées*, un peu rudes, aiguës, *presque linéaires*, atténuées aux 2 extrémités, les *inférieures trinervées*, les supérieures *uninervées*; involucre à folioles apprimées, les extérieures lancéolées, les intérieures obtuses; aigrette roussâtre; capitules très nombreux en corymbe compact dont les *rameaux sont chargés de bractéoles*; ligules d'un bleu lilas, fleurs du centre tubuleuses, jaunes.

Coteaux, lieux incultes de la région méditerranéenne jusque dans la Drôme, l'Ardèche, les Basses-Alpes. — Espagne, Italie, Hongrie, Transylvanie, Russie, Caucase. = Septembre-octobre.

1805. — A. trinervis Desf. (GALATELLA RIGIDA DC.). — Espèce voisine de la précédente : tige de 3-5 dm., dressée, très raide, striée, très feuillée, très glabre ainsi que les feuilles; celles-ci *dépourvues de ramuscules à leur aisselle*, plus longues, exactement linéaires, *non ponctuées, toutes trinervées*; feuilles des rameaux florifères moins nombreuses; pédicelles peu chargés de bractéoles; capitules en corymbe compact, à ligules bleues, fleurs du centre tubuleuses, jaunes.

Bois montagneux des Cévennes (Lozère et Aveyron) et des Pyrénées-Orientales. = Septembre.