

1830. — *Senecio Cineraria* DC. — Plante vivace; tiges de 3-6 dm. *sous-frutescentes* à la base, dressées, raides, rameuses, *blanches-tomenteuses en dessous, cotonneuses et plus ou moins vertes en dessus, ovales-oblongues ou oblongues, profondément pennatifidées ou presque pennatiséquées, à segments presque égaux, oblongs-obovales ou oblongs, entiers ou lobés, souvent bi-trifides, les inférieures pétiolées, les supérieures sessiles; involucre blanc-tomenteux, à folioles oblongues-lancéolées; achaines glabres; capitules en corymbe très dense; fleurs jaunes à 10-12 ligules.*

Sables et rochers de la région méditerranéenne des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales, remonte jusque dans la Drôme; Corse. — Espagne, Italie. = Juin-juillet.

*Senecio Cineraria*


1831. — *S. leucophyllus* DC. — Plante vivace; souche rampante, émettant des rosettes de feuilles; tige de 1-2 dm. *herbacée, ascendante, simple, blanche-cotonneuse; feuilles réunies en touffes à la base des tiges, épaisses, blanches-tomenteuses sur les deux faces, à sommet arrondi, lyrées, pennatifidées ou pennatifides, les caulinaires sessiles à segments oblongs, les inférieures pétiolées à segments ovales-arrondis, entiers ou lobés, contigus; involucre blanc, laineux; achaines pubescents; capitules en corymbe compact, brièvement pédicellés à 5-7 ligules; fleurs jaunes.*

Rocailles des hautes montagnes: Pyrénées orientales françaises et espagnoles, mont Mézenc dans la Haute-Loire. = Juillet-août.

*Senecio leucophyllus*

1832. — *S. incanus* L. — Plante vivace; souche rampante émettant des rosettes de feuilles lâches; tiges de 5-20 cm. dressées ou ascendantes, blanches-laineuses; *feuilles minces, blanches-tomenteuses à tomentum très court et peu épais, pennatiséquées, non lyrées, à segments presque égaux et également espacés, ceux des feuilles inférieures entiers ou offrant quelques lobes profonds, les supérieures à segments très étroits, linéaires, aigus, entiers; involucre blanc, laineux, à folioles écartés supérieurement; achaines glabres; capitules à 2-4 ligules peu nombreux, pauciflores (6-8 fleurs) petits (involucre de 4 mm. de diamètre environ); fleurs jaunes.*

Rochers, pâturages des hautes montagnes: Savoie, Haute-Savoie, Dauphiné, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes. — Suisse, Tyrol, Italie. = Juillet-août.

*Senecio incanus*

1833. — *S. uniflorus* All. — Plante vivace à tige très courte de 3-10 cm. dressée ou ascendante, simple, blanche-tomenteuse; feuilles à tomentum d'un blanc de neige sur les deux faces, *les inférieures pétiolées, ovales ou oblongues-obovales, entières, crénelées, incisées ou pennatilobées à lobes obtus, les supérieures petites, linéaires, très entières, presque bractéiformes; involucre tomenteux à folioles lancéolées-linéaires; achaines pubescents; capitule assez gros, 20-27 mm. de diamètre, solitaire, terminal à ligules nombreuses (7-13); fleurs jaunes.*

Rochers des hautes montagnes, très rare: Hautes-Alpes, Savoie. — Valais, Piémont, Lombardie, Tyrol. = Juillet-août.

*Senecio uniflorus*