

TABLEAU DES ESPÈCES

- ✠ Involucre à folioles intérieures oblongues, obtuses, les extérieures largement ovales, tomenteuses; feuilles inférieures très amples. **I. Helenium** 1853
- ✠ Involucre à folioles aiguës, les extérieures lancéolées ou linéaires.
- > Achaines pourvus de côtes, tronqués ou atténués au sommet; soies de l'aigrette non insérées sur une cupule.
- ✠ Fleurs de la circonférence ligulées rayonnantes.
- + Feuilles pubescentes, velues ou laineuses.
- ∪ Feuilles caulinaires embrassantes, au moins les supérieures.
- × Achaines velus; capitules en corymbe, rarement solitaires; feuilles molles.
- Plante entièrement laineuse, blanchâtre; feuilles ovales-lancéolées; ligules poilues et glanduleuses. **I. helenioides** 1854
- Plante verte seulement un peu pubescente ou soyeuse; feuilles assez étroitement lancéolées; ligules glanduleuses, dépourvues de poils.
- I. britannica** 1853
- × Achaines glabres; tige presque toujours monocéphale; feuilles coriaces.
- I. hirta** 1836
- ∪ Pas de feuilles embrassantes.
- Capitule solitaire (très rarement 2 ou 3) terminant la tige; achaines poilus.
- I. montana** 1837
- Capitules nombreux en corymbe; achaines glabres. **I. Vaillantii** 1858
- + Feuilles glabres ou presque glabres.
- = Feuilles oblongues ou lancéolées; achaines glabres.
- Feuilles étalées presque horizontalement ou réfléchies, embrassantes, capitules en corymbe lâche **I. salicina** 1859
- Feuilles dressées, très rapprochées, comme imbriquées, capitules en corymbe très court et très compact **I. spiræifolia** 1860
- = Feuilles linéaires, charnues, glabres, obtuses, entières ou tridentées au sommet; achaines velus **I. crithmoides** 1861
- ✠ Fleurs toutes ou presque toutes tubuleuses, non rayonnantes.
- Plante pubescente, non glanduleuse; feuilles tomenteuses en dessous, les moyennes et les inférieures pétiolées. **I. Conyza** 1862
- Plante glanduleuse et visqueuse; feuilles non tomenteuses, les caulinaires ailées-décourantes à la base **I. bifrons** 1863
- > Achaines dépourvus de côtes, contractés en col au sommet élargi en forme de cupule, sur laquelle sont insérées les soies de l'aigrette.
- Capitules petits; fleurs de la circonférence à ligules très courtes ne dépassant pas l'involucre; feuilles linéaires **I. graveolens** 1864
- Capitules assez grands; fleurs de la circonférence rayonnantes à ligules dépassant longuement l'involucre; feuilles lancéolées embrassantes.
- I. viscosa** 1865

1853. — **Inula Helenium** L. *Aunée*. — Plante vivace à tige de 10-15 dm., robuste, dressée, pubescente, rameuse au sommet; feuilles dentées, pubescentes-tometeuses en dessous, vertes et un peu rudes en dessus, les inférieures très amples (atteignant 80 cm. avec le pétiole), elliptiques-oblongues, décourantes et longuement pétiolées, les supérieures ovales-lancéolées, sessiles, un peu embrassantes; folioles intérieures de l'involucre scarieuses, oblongues, obtuses, les extérieures herbacées larges, ovales, tomenteuses; achaines blonds, subtétragones, glabres; aigrette rousâtre; capitules très gros en corymbe; fleurs jaunes à ligules longues, rayonnantes.

Près humides, bois, haies; toute la France, sauf la région méditerranéenne. — Toute l'Europe jusque dans les régions boréales; Orient. = Juillet-août.



Inula Helenium.