



Carpesium cernuum

1902. — Carpesium cernuum L. — Plante vivace de 3-5 dm. dressée, pubescente, rameuse, à rameaux étalés; feuilles lancéolées ou ovales-lancéolées, dentées, rétrécies en court pétiole; involucre pubescent à la base, à folioles extérieures herbacées, oblongues-lancéolées, hispides, réfléchies; les suivantes scarieuses, largement oblongues-linéaires, recourbées au sommet; achaines longs d'environ 4 mm. presque linéaires, cylindrés, rétrécis au sommet; capitules hémisphériques solitaires terminaux, penchés sur un pédoncule épaissi et réfléchi, et formant une large panicule feuillée très lâche; fleurs jaunâtres.

Lieux frais et ombragés : Savoie et Haute-Savoie, Ain, Isère, Drôme, Alpes-Maritimes, Pyrénées-Orientales. — Espagne, Italie, Suisse, Autriche. = Août-septembre.

Genre 375. — TANACETUM Tourn. — Tanaisie.

(Du grec *tanaos*, long; les fleurs restent longtemps sans se flétrir.)

Involucre hémisphérique à folioles imbriquées; fleurs toutes tubuleuses; achaines obconiques pourvus de côtes longitudinales et terminés par un disque aussi large que le sommet, surmonté d'un rebord membraneux.

La *Tanaisie vulgaire* est tonique et vermifuge.

TABLEAU DES ESPÈCES

Feuilles assez amples ayant pour le moins 5 cm. de longueur à segments régulièrement pennés.

Feuilles largement divisées, corymbe serré. **T. vulgare 1903**

Feuilles finement découpées, corymbe très lâche. **T. Audiberti 1904**

Feuilles petites n'atteignant pas 2 cm. de longueur, à segments linéaires trifides.

T. annum 1905



Tanacetum vulgare

✓ 1903. — Tanacetum vulgare L. Tanaisie vulgaire.

— Plante vivace à tige de 8-12 dm. droite, simple, glabre; feuilles ovales ou ovales-oblongues, glabres, ponctuées, largement découpées, pennatiséquées, à rachis ailé-denté au moins dans sa moitié supérieure; segments allongés, oblongs, pennatifides ou pennati-partites à lobes assez larges, aigus, souvent dentés sur le bord externe, les caulinaires sessiles, demi-embrassantes, auriculées; involucre à folioles coriaces, obtuses; capitules jaunes, pédonculés, serrés en corymbe; plante très odorante.

Lieux incultes, bords des chemins, des rivières dans toute la France. — Europe, Sibérie, manque dans une partie de la région méditerranéenne. = Juillet-septembre.



Tanacetum Audiberti

1904. — T. Audiberti DC. — Plante vivace à tige de 2-5 dm. droite, simple, presque glabre; feuilles ovales-oblongues ou oblongues dans leur pourtour, pubescentes, finement découpées, pennatiséquées, à rachis étroitement bordé, non ailé, offrant quelques lobules foliacés; segments courts oblongs-linéaires, à petits lobes étroits ne dépassant guère 1 mm. de largeur, dentés sur les deux bords; feuilles caulinaires sessiles, non ou très faiblement auriculées; involucre à folioles coriaces, les extérieures aiguës; capitules jaunes, longuement pédonculés, en corymbe très lâche.

Montagnes de la Corse et de la Sardaigne. = Juillet-août.