

1151. — *Rubus saxatilis* L. — Turion herbacé, subcylindrique, pubescent, inerme ou garni de quelques fins acicules; feuilles minces, vertes en dessous, à 3 folioles grossièrement dentées, la terminale obovale rhomboïdale, les latérales bilobées; *stipules adhérent brièvement à la base du pétiole*; *rameau florifère naissant de la souche*, faible, long de 20-30 cm., terminé par un petit corymbe de 5-8 fleurs; sépales dressés ou étalés; pétales blancs, dressés, petits, lancéolés-oblongs; étamines dépassant les styles; drupéoles 2-6, gonflées, glabres, rougeâtres à la maturité.

Lieux rocheux de la région subalpine des montagnes: Vosges, Jura, Alpes. Forez, Auvergne, Cévennes, Pyrénées; collines de la Lorraine, Haute-Marne, Aube, environs de Paris. — Zone boréale et tempérée de l'Europe et de l'Asie. = Mai-juin.

*Rubus saxatilis*

1152. — *R. idæus* L. *Framboisier*. — Turion lignifié, dressé, cylindrique, glaucescent, à aiguillons rougeâtres, subulés, fins; *feuilles imparipennées*, à 3-7 folioles blanches-tomentueuses en dessous; *stipules filiformes adhérent au pétiole*; *rameaux florifères naissant du turion bisannuel, courts*; inflorescence multiflore; pédoncules souvent arqués, pendants; sépales très étalés ou réfléchis; pétales blancs, petits, lancéolés; jeunes carpelles gris-tomentueux; fruit ovale ou subglobuleux, se détachant, du réceptacle conique à drupéoles nombreuses, petites, tomenteuses, rouges à la maturité.

Bois et lieux rocheux des montagnes, et dans les plaines du nord de la France; nul dans la région méditerranéenne. — Tout l'hémisphère boréal, dans la région des forêts. = Mai-juillet. — Très généralement cultivé pour ses fruits (framboises) qu'on mange comme les fraises.

*Rubus idæus*

1153. — *R. suberectus* Anders. — Turion dressé, assez court, subcylindrique jusqu'au milieu, garni d'aiguillons petits, d'un rouge obscur, à base conique; *feuilles minces*, vertes, glabrescentes, non plissées, à 3-7 folioles dentées en scié, les inférieures subsessiles, la terminale grande, ovale en cœur, acuminée; *rameau florifère court*; inflorescence dépassant peu les feuilles; sépales verts sur le dos, bordés de blanc, étalés; pétales blancs, grands, obovales; *étamines dépassant les styles*; drupéoles peu nombreuses, longtemps rougeâtres, puis noires.

Lisières et clairières des bois sablonneux, siliceux, dans le Nord, de l'Alsace-Lorraine à la Normandie; rare dans les Alpes et le Plateau central. — Europe, surtout moyenne. = Juin.

*Rubus suberectus*

1154. — *R. fissus* Linde. — Voisin du précédent. Turion dressé, plus anguleux, garni d'aiguillons plus nombreux, plus longs, subulés, jaunâtres; *feuilles vertes*, glabrescentes, à 5-7 folioles plus ou moins plissées; inflorescence peu développée; sépales verts sur le dos, bordés de blanc, étalés; pétales blancs, obovales; *étamines sensiblement plus courtes que les styles* dès l'anthèse; drupéoles peu nombreuses, à la fin noires.

Ardennes belges, à peu de distance de la frontière française. — Iles Britanniques, Norvège, Danemark, Allemagne du Nord. = Juin.

*Rubus fissus*