

♂ Feuilles sessiles, au moins les moyennes.

♂ Tige frutescente inférieurement; capitules en longue panicule raide; feuilles toutes sessiles, multiséquées, garnies jusqu'à leur base de segments filiformes dont les plus inférieurs embrassent la tige.

A. chamæmelifolia 1914

♂ Tige herbacée; feuilles moyennes petites, sessiles, oblongues, cunéiformes, dentées, trifides, ou entières, les inférieures palmatiséquées.

Involucre peu velu; capitules dressés contenant 12-15 fleurs; corolle glabre.

A. spicata 1917

Involucre laineux; capitules ordinairement penchés contenant 20-30 fleurs; corolle couverte de longs poils. *A. eriantha* 1918

⊂ Capitules ovoïdes ou ovoïdes-coniques; corolle insérée au sommet de l'ovaire; involucre glabre et luisant; plante à la fin glabre ou presque glabre.

Capitules ovoïdes; plante non glutineuse *A. campestris* 1919

Capitules ovoïdes-coniques, plus petits; plante glutineuse dans sa partie supérieure *A. glutinosa* 1920

⊂ Capitules ovoïdes-oblongs ou subcylindriques; corolle insérée très obliquement sur l'ovaire; involucre tomenteux ou pubescent à sa base.

♀ Feuilles, même adultes, blanches-tomenteuses, bipennatiséquées.

Rameaux florifères flexueux, arqués-réfléchis; capitules penchés, ovoïdes oblongs. *A. maritima* 1921

Rameaux florifères assez raides, droits, non arqués; capitules dressés, oblongs.

A. gallica 1922

♀ Feuilles adultes glabres ou glabrescentes, celles des tiges florifères presque toutes entières, linéaires; capitules oblongs, subcylindriques.

A. cærulescens 1923



Artemisia Absinthium



Artemisia arborescens

✓ 1906. — *Artemisia Absinthium* L. *Absinthe*. —

Plante vivace de 4-6 dm. *herbacée*, dressée, blanchâtre; feuilles soyeuses, *blanches en dessous, verdâtres en dessus*, pétiolées à pétiole non auriculé, ovales, les *caulinaires bipennatiséquées à lobes oblongs*, linéaires ou lancéolés, obtus; *involucre blanchâtre*, à folioles extérieures linéaires à peine scarieuses, les intérieures ovales, très obtuses, largement scarieuses; *achaines lisses*; réceptacle couvert de longs poils blancs; *capitules globuleux*, assez petits, 3 à 4 mm. de diamètre, brièvement pédicellés, *penchés*, en grande panicule feuillée à rameaux dressés; plante très odorante.

Lieux incultes, pierreux, bords des rivières, souvent naturalisé; Est et Sud-Est, littoral de l'Ouest, Normandie, Bretagne, Pyrénées; Corse. — Europe, Sibérie, Afrique septentrionale. = Juillet-septembre.

✓ 1907. — *A. arborescens* L. — Plante vivace de 8-10 dm. *ligneuse*, dressée, blanche, soyeuse;

feuilles soyeuses, *très blanches sur les deux faces*, les *caulinaires bipennatiséquées, à divisions étroites linéaires*, obtuses, à pétiole court non auriculé; *involucre blanc, tomenteux*, à folioles extérieures linéaires-oblongues à peine scarieuses, les intérieures laineuses sur le dos, ovales, très obtuses, largement scarieuses; *achaines glanduleux*; réceptacle couvert de longs poils d'un blanc sale; capitules globuleux, de 5-6 mm. de diamètre, assez longuement pédicellés, *dressés* pendant la floraison, en grande panicule feuillée.

Rochers maritimes, Var; Corse. = Espagne, Portugal, Sardaigne, Italie, Dalmatie, Orient, Afrique septentrionale. = Juin-juillet.