


*Artemisia vulgaris**Artemisia suaveolens**Artemisia chamæmelifolia**Artemisia nana*

1912. — *Artemisia vulgaris* L. Armoise. — Plante vivace, tige de 7-12 dm. herbacée, striée, rougeâtre, un peu pubescente, rameuse; feuilles pennati ou bipennatifidées, auriculées à la base, à segments assez largement oblongs-lancéolés, aigus, glabres (très rarement blanchâtres, cendrés) en dessus, blanches-tomenteuses en dessous; involucre blanc, tomenteux; réceptacle glabre; capitules ovoïdes-oblongs, subsessiles en glomérules sur les rameaux étalés-dressés et formant une grande panicule feuillée; fleurs jaunâtres ou rougeâtres.

Varie à souche émettant de nombreux rejets, feuilles à segments plus étroits et plus allongés, capitules solitaires, rougeâtres (*A. VERLITORUM* Lamt.).

Lieux incultes, dans toute la France; Corse. — Europe, Sibérie, Afrique septentrionale. = Juillet-septembre.

1913. — *A. suave* Jord. — Plante vivace de 6-10 dm., à odeur suave; tiges ligneuses inférieurement, rameuses; feuilles ponctuées, toutes pétiolées, à pétiole auriculé, glabres dans la plante adulte, à limbe ovale-orbiculaire, bipennatiséqué, à segments linéaires très étroits, étalés, obtus; feuilles florales triséquées ou linéaires, entières, dépassant très longuement les capitules; involucre à folioles extérieures lancéolées, les intérieures obtuses et largement scarieuses; réceptacle glabre; capitules assez petits, 2-3 mm. de diamètre, globuleux, pédicellés, penchés, formant une panicule très feuillée. Port de l'*A. camphorata*.

Isère, autour de Vienne. = Septembre-octobre.

1914. — *A. chamæmelifolia* Vill. — Plante vivace de 3-5 dm., frutescente inférieurement, dressée, raide, glabre ou presque glabre, très feuillée; feuilles glabres ou glabrescentes à contour ovale-oblong, les caulinaires sessiles, bi-tripennatiséquées, garnies jusqu'à la base de segments dont les plus inférieurs embrassent la tige, à lanières linéaires très étroites, presque filiformes; involucre glabre ou un peu pubescent, à folioles obtuses, les extérieures linéaires scarieuses au sommet, les intérieures ovales largement scarieuses; réceptacle glabre; capitules globuleux, pédicellés, penchés en panicule raide, longue, étroite et très feuillée. Odeur aromatique.

Rochers et lieux pierreux des montagnes: Isère, Hautes-Alpes, Basses-Alpes. — Piémont. = Juillet-août.

1915. — *A. nana* Gaud. — Plante vivace de 10-20 cm., herbacée, ascendante, glabre ou pubescente inférieurement; feuilles pubescentes ou presque glabres, toutes pétiolées à pétiole plan, auriculé à la base, les inférieures à contour suborbiculaire, à 4-5 segments triséqués, les moyennes oblongues pennatiséquées, toutes à lanières linéaires-lancéolées, élargies au sommet, mucronulées, les supérieures indivises; involucre glabre ou un peu pubescent; réceptacle glabre; capitule globuleux, pédicellés, droits ou penchés, formant une grappe unilatérale plus ou moins dense, ordinairement simple, parfois rameuse à la base.

Rochers des hautes montagnes: Isère, Savoie, Hautes-Alpes. — Piémont, Tyrol. = Juillet-août.