

TABLEAU DES ESPÈCES


- + Souche épaisse, vivace; tiges nues, assez robustes, à gros capitules (au moins 2 cm. de diamètre).
 Feuilles à limbe obovale-spatulé, nettement rétréci en pétiole **B. perennis** 1926
 Feuilles à limbe oblong-ovale, insensiblement rétréci en pétiole. **B. silvestris** 1927
- + Souche très grêle; petites plantes grêles à petits capitules n'atteignant pas 2 cm. de diamètre (ordinairement 10-15 mm.).
 Racine vivace pourvue d'un rhizome; tiges toujours simples et nues; plante naine. **B. Bernardi** 1928
 Racine fibreuse, annuelle, sans rhizome; tige ordinairement ramifiée et feuillée dans sa partie inférieure. **B. annua** 1929



Bellis perennis



Bellis silvestris



Bellis Bernardi

1926. — *Bellis perennis* L. *Pâquerette vivace*. — Souche vivace; tige de 5-15 cm. scapiforme, simple et nue, pubescente; feuilles toutes radicales en rosette, à la fin glabrescentes, à limbe obovale-spatulé, uninervé, superficiellement crénelé, nettement pétiolées; involucre pubescent à folioles lancéolées; achaines petits, velus, obovales, fortement marginés; capitule solitaire, terminal, de 2 cm. de diamètre environ; fleurs du centre jaunes, tubuleuses, celles de la circonférence ligulées à ligules blanches ou purpurines, oblongues-linéaires, une fois plus longues que l'involucre.

Varie à tiges feuillées à la base avec des rejets latéraux (*B. HYBRIDA* Ten.).

Pelouses, prés, bords des chemins dans toute la France. — Europe, Orient. = Mars-novembre.

1927. — *B. silvestris* Cyrillo. — Espèce vivace voisine de la précédente, plus robuste, 15-30 cm. tige scapiforme, pubescente; feuilles en rosette radicale, pubescentes-grisâtres et souvent presque veloutées, plus allongées, à limbe oblong-ovale, trinervé, insensiblement rétréci en pétiole, entier ou faiblement crénelé; involucre à folioles plus longues, plus aiguës; capitules grands, atteignant et dépassant 3 cm. de diamètre, ligules purpurines plus larges; plante automnale paraissant quelquefois à la fin de l'hiver.

Varie rarement (Charente-Inférieure, Corse), à achaines surmontés de soies écailleuses simulant une aigrette (*B. PAPPULOSA* Boiss.).

Prés, pacages de la région méditerranéenne, des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales, Charente-Inférieure, Corse. — Tout le littoral méditerranéen, Afrique septentrionale. = Septembre-novembre.

1928. — *B. Bernardi* Boiss. Reut. — Rhizome vivace, court, oblique, émettant des fibres radicales; plante naine de 1-5 cm., tige scapiforme simple et nue, pubescente; feuilles très petites, toutes radicales, glabres, ciliées, uninervées, obovales-spatulées, très obtuses, entières ou offrant quelques faibles crénelures, atténuées en pétiole très court; involucre glabre à folioles noires, oblongues ou elliptiques, obtuses; achaines glabres; capitule très petit, 10-12 mm. de diamètre, solitaire, terminal, ligules blanches ou roses 2 fois plus longues que l'involucre.

Prés, pâturages de la région élevée des montagnes de la Corse. = Juillet-août.