

**Leucanthemum tomentosum****Leucanthemum discoideum****Leucanthemum graminifolium****Leucanthemum maximum**

1935. — *Leucanthemum tomentosum* G. G. — Espèce vivace, voisine de la précédente, *entièrement blanche-tomenteuse*; souche pourvue de très longues fibres; tiges très courtes, de 3-6 cm., ascendantes, *ordinairement entièrement nues ou n'offrant qu'une seule feuille linéaire*; feuilles serrées et condensées à la base des tiges, à contour plus largement ovale, à lobes larges, lancéolés, obtus, *presque palmatifides*, à pétiole très court; involucre laineux; couronne des achaines plus courte; capitules plus petits; ligules blanches ou purpurines plus courtes et plus élargies.

Rochers des hauts sommets de la Corse. = Juillet-août.

1936. — *L. discoideum* All. (sub *Chrysanthemo*). **PLAGIUS ALLIONII** L'Hér. — Plante vivace à tige de 3-7 dm., dressée, glabre; *feuilles dentées en scie, les radicales et les inférieures oblongues-obovales, rétrécies en pétiole, les suivantes sessiles, ni demi-embrassantes, ni auriculées*, étroites, oblongues ou lancéolées, atténuées ou un peu obtuses au sommet, *les supérieures linéaires-lancéolées, acuminées*; involucre ombiliqué à folioles coriaces, les extérieures lancéolées, les intérieures *presque linéaires, peu scarieuses*, tachées de fauve au sommet; achaines dépourvus de couronne; capitules solitaires au sommet des rameaux *longue-ment nus*; fleurs *toutes tubuleuses* et d'un jaune-orangé.

Ravins et vallons ombragés des Alpes-Maritimes et de la Ligurie. = Août-septembre.

1937. — *L. graminifolium* Lamk. — Plante vivace, glabre; tige de 1-3 dm., dressée, *toujours simple et monocéphale*, longuement nue au sommet; *feuilles entières, linéaires, très étroites, de 1 à 2 mm. de largeur*, les radicales souvent plus larges et oblongues-ovales, atténuées en pétiole, entières ou offrant quelques dents peu saillantes; involucre à folioles extérieures lancéolées, les intérieures spatulées; *achaines des ligules surmontés d'une couronne complète*; capitules de 30 à 35 mm. de diamètre.

Coteaux calcaires du Midi : Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Ardèche, Hérault, Corbières de l'Aude jusqu'à 1.500 mètres d'altitude, Pyrénées Orientales, Ariège, Aveyron, Lozère, Charente, Charente-Inférieure, Cher. — Italie, Dalmatie. = Mai-juin.

1938. — *L. maximum* DC. — Plante vivace à tige de 35-70 cm., dressée, ordinairement simple, glabre; *feuilles inférieures pétiolées à limbe elliptique-lancéolé, rétréci aux deux extrémités, obtus au sommet, denté tout autour à dents obtuses égales, peu profondes, les suivantes rétrécies en court pétiole ailé ou sessiles, oblongues-lancéolées, lâchement et superficiellement dentées tout autour ou seulement au sommet*; involucre à folioles pâles, brunâtres sur les bords, les extérieures lancéolées, les intérieures oblongues-linéaires, très obtuses; achaines nus ou munis d'une couronne incomplète; capitule grand, atteignant jusqu'à 6 cm. de diamètre.

Rochers, bois de la chaîne des Pyrénées, Ariège. = Juillet-août.