

1939. — *Leucanthemum vulgare* Lamk. *Grande-Marguerite*. — Plante vivace de 2-8 dm.; feuilles irrégulièrement dentées, lobées ou pennatifides, les inférieures obovales ou spatulées, longuement pétiolées, les suivantes oblongues-obovales ou oblongues, sessiles, demi-embrassantes et auriculées à la base; involucre à folioles bordées de brun, les intérieures oblongues-linéaires, très obtuses et scarieuses au sommet; achaines tous dépourvus de couronne; capitules atteignant 4 1/2 cm. de diamètre. Espèce polymorphe; involucre à folioles bordées de noir dans la zone des montagnes (*L. DELARBREI* Timb.).

Prairies, lieux herbeux, champs dans toute la France. — Europe, Sibérie. = Mai-août.



*Leucanthemum vulgare*

1940. — *L. subglaucum* de Larambergue. — Plante vivace de 4-8 dm.; feuilles fermes, glaucescentes, les inférieures rétrécies en pétiole à limbe obovale-oblong, denté ou lobulé-denté, les suivantes sessiles, largement oblongues, à dents ouvertes, profondes et régulières, aiguës, auriculées-dentées à la base, les supérieures étroites, acuminées; involucre pâle à folioles bordées de brun-clair, les intérieures, oblongues-linéaires, à sommet largement scarieux et lacéré; achaines des ligules surmontés d'une couronne dentée complète, plus souvent incomplète, quelquefois nus; capitules grands, atteignant 6 cm. de diamètre.

Pentes méridionales du Plateau central : Aveyron, Lozère, Tarn, Gard, Loire, Hérault. = Juin-juillet.



*Leucanthemum subglaucum*

1941. — *L. pallens* DC. — Plante vivace de 3-6 dm.; feuilles inférieures spatulées, crénelées au sommet, atténuées en pétiole grêle, les moyennes oblongues ou cunéiformes, dentées en scie dans leur moitié supérieure, atténuées en pétiole pourvu de dents à la base mais non embrassant, les supérieures linéaires ou linéaires-oblongues, sessiles, dentées ou entières; involucre pâle à folioles intérieures largement oblongues-obovales très obtuses, à partie scarieuse large, d'un blanc argenté; achaines des ligules surmontés d'une demi-couronne bipartite presque aussi longue que le tube de la fleur, quelquefois complète et très courte du côté externe; capitules de grandeur variable. Espèce polymorphe.

Coteaux de la région méditerranéenne jusqu'à la base des Alpes et du Plateau central, Pyrénées. — Espagne, Italie. = Juin-juillet.



*Leucanthemum pallens*

1942. — *L. cuneifolium* Le Grand (*L. MAXIMUM* et *MONTANUM* G. G. p. p.). — Plante vivace de 3-6 dm., toujours simple et monocéphale, ordinairement glabre, très longuement nue au sommet; feuilles glabres ou les inférieures velues, celles-ci cunéiformes crénelées au sommet, rétrécies en pétiole ailé, les moyennes étroitement sessiles, oblongues-linéaires, dentées en scie à dents régulières, les supérieures presque linéaires, mucronées; involucre à folioles bordées de noir ou de brun, les intérieures linéaires-oblongues; achaines des ligules surmontés d'une demi-couronne dentée, quelquefois complète; capitules de grandeur très variable, atteignant jusqu'à 6 cm. de diamètre.

Bois, prairies des montagnes : Dauphiné, Provence, Cévennes, Pyrénées-Orientales; Corse. = Juillet-août.



*Leucanthemum cuneifolium*