

- ♂ 1967. — *Achillea tomentosa* L. — Plante vivace à souche émettant des rejets feuillés; tiges de 8-25 cm., dressées ou ascendantes, grêles, simples, velues; feuilles d'un vert blanchâtre, velues ou presque tomenteuses, oblongues-linéaires, rétrécies de bas en haut, bipennatiséquées, à segments très rapprochés, incisés, quelques-uns entiers, à lobules presque linéaires, mucronulés; involucre velu à folioles intérieures oblongues, obtuses; réceptacle à écailles oblongues-obovales, aiguës; capitules petits, 2-3 mm. de diamètre, ovoides, en petit corymbe compact, terminal; fleurs d'un jaune vif.

Coteaux secs du Midi, des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales, remonte jusque dans les Hautes-Alpes, l'Isère, l'Ardèche et la Drôme, la Loire, la Savoie. — Valais, Espagne, Italie, Tyrol, Russie méridionale. = Mai-juin.



*Achillea tomentosa*

1968. — *A. Ageratum* L. — Plante vivace à souche ligneuse; tiges de 25-50 cm., dressées, simples ou rameuses au sommet, glabres ou brièvement pubescentes; feuilles rudes, très brièvement hispides, fortement ponctuées, les inférieures oblongues-obovales, lobées à lobes dentés, les supérieures sessiles, oblongues, très obtuses au sommet, dentées en scie; involucre ovoïde, un peu velu, à folioles intérieures oblongues; réceptacle à écailles lancéolées, aiguës; capitules petits, 2 à 4 mm. environ de diamètre, devenant subcylindriques à la maturité, pédicellés, en corymbe compact plus ou moins rameux; fleurs jaunes à ligules courtes.

Lieux humides, bords des chemins, des fossés; région méditerranéenne, des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales, jusque dans la Drôme et les Hautes-Alpes; Corse. — Portugal, Espagne, Italie. = Juillet-août.



*Achillea Ageratum*

- ✕ 1969. — *A. Ptarmica* L. *Herbe à éternuer*. — Plante vivace à racine rampante; tige de 3-6 dm., dressée, raide, rameuse supérieurement, striée, glabre ou pubescente dans le haut; feuilles raides, glabres ou presque glabres, non ponctuées, sessiles, très allongées, linéaires-lancéolées, régulièrement atténuées de la base au sommet, aiguës, très finement dentées en scie, à dents très rapprochées, mucronées, cartilagineuses; involucre hémisphérique, velu, à écailles pourvues d'une marge bleuâtre; capitules larges de 15 mm. de diamètre environ, longuement pédicellés en corymbe lâche; fleurs blanches, à ligules égalant au moins la longueur de l'involucre.

Lieux humides, presque toute la France; manque à la région méditerranéenne. — Europe septentrionale et moyenne, Sibérie, Amérique boréale. = Juillet-septembre.



*Achillea Ptarmica*

1970. — *A. pyrenaica* DC. — Plante vivace, forme de l'espèce précédente. Tige de 2-4 dm., couchée à la base, redressée, raide, non striée, pubescente; feuilles assez fortement pubescentes, couvertes de punctuations imprimées sur les faces, sessiles, proportionnellement plus larges, lancéolées, atténuées seulement vers le sommet, presque obtus et non à partir de la base, à dents pourvues d'un rebord blanchâtre plus épais, plus cartilagineux; capitules plus gros.

Pyrénées françaises et espagnoles, Cévennes de la Lozère et du Gard, Auvergne. = Juillet-septembre.



*Achillea pyrenaica*