




Achillea Millefolium



Achillea odorata



Achillea chamæmelifolia

X

1979. — Achillea Millefolium L. Millefeuille, Herbe au charpentier. — Plante vivace à racine rampante; tiges de 2-7 dm., dressées, pubescentes, parfois laineuses ainsi que les feuilles; celles-ci molles, à contour oblong-linéaire ou linéaire, bipennatiséquées à segments très nombreux, linéaires, mucronulés, non disposés dans un même plan, à rachis entier, ceux de la base de la feuille égalant ceux du milieu; involucre ovoïde, poilu, à folioles bordées d'une marge pâle, brunâtre ou presque noire; capitules petits, en corymbe compact; fleurs blanches, souvent purpurines, à ligules plus courtes que la moitié de l'involucre.

Espèce polymorphe : varie à lacinures des feuilles plus nombreuses, plus rapprochées, plus ténues, presque sétacées avec les fleurs plus petites, d'un blanc sale (A. SETACEA W. K.).

Prés, bois, bords des chemins, partout. — Toute l'Europe. = Juin-septembre.

1980. — A. odorata L. — Plante vivace à souche courte, noueuse, stolonifère; tiges de 12-30 cm., dressées ou ascendantes, pubescentes; feuilles d'un vert grisâtre, pubescentes, à contour oblong, les inférieures et celles des rosettes pétiolées, bipennatiséquées, les caulinaires sessiles, petites, atteignant rarement 2 cm. 1/2 de longueur, pennatiséquées, à segments entiers ou incisés, ceux-ci au nombre de 8-12 de chaque côté, presque égaux, rapprochés, linéaires, à lobes mucronulés; involucre ovoïde, poilu, à folioles offrant une marge brunâtre; capitules petits, en corymbe subglobuleux, compact; fleurs d'un blanc sale ou un peu jaunâtre, à ligules courtes.

Coteaux, bords des chemins de la région méditerranéenne, des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales, remonte dans les Hautes-Alpes, l'Ardèche, la Drôme, la Lozère. — Espagne, Tyrol, Istrie. = Juin-juillet.

1981. — A. chamæmelifolia Pourr. — Plante vivace à sonche rameuse, non rampante; tiges de 2-4 dm., dressées, brièvement pubescentes ainsi que les feuilles; celles-ci pétiolées, à contour ovale-lanceolé ou oblong-lanceolé, à rachis étroit, non denté à segments peu nombreux, 3-6 de chaque côté, étalés, espacés, étroits, linéaires, entiers ou quelques-uns incisés, les inférieurs aussi longs que les moyens; involucre ovoïde, presque glabre; capitules en corymbe composé un peu lâche; fleurs blanches à ligules ne dépassant pas la moitié de l'involucre.

Rochers des Pyrénées-Orientales françaises et espagnoles. = Juin-juillet.

Genre 390. — BUPHTHALMUM L.

(Du grec *bous*, bœuf, *ophthalmos*, œil : allusion au capitule.)

Involucre hémisphérique à folioles imbriquées, appliquées, presque égales; fleurs de la circonférence femelles sur un seul rang, ligulées à tube cylindrique; celles du centre hermaphrodites, tubuleuses; chaînes des ligules triquètes, ceux du centre plus petits; réceptacle presque plan garni d'écaillles.