



Onopordum Acanthium

2000. — *Onopordum Acanthium* L. — Plante bisannuelle de 5-15 dm., dressée, raide, rameuse au sommet, largement ailée, épineuse; feuilles pubescentes, aranéuses, blanches-tomenteuses en dessous, oblongues, sinuées-anguleuses à bords fortement épineux, les radicales atténuées à la base, les caulinaires à longue décurrence foliacée; involucre gros, globuleux, aranéux à folioles non glanduleuses, terminées par un appendice longuement et étroitement lancéolé-subulé, épineux, les extérieures réfléchies; aigrette rousse, à peine une fois plus longue que l'achaine; achaines subtétragones, sillonnés transversalement; fleurs purpurines, égales, à corolle glabre.

Lieux incultes, bords des chemins dans toute la France. — Presque toute l'Europe, Asie occidentale. = Juin-septembre.

Genre 399. — **CINARA** Vaill. — *Artichaut*.

(Du grec *kinara*, artichaut.)

Involucre à folioles imbriquées atténuées en épine ou obtuses, émarginées et mucronées; réceptacle hérissé de soies; étamines à filets libres; anthères terminées par un appendice très obtus; achaines obovales tétragones un peu comprimées; soies de l'aigrette plumeuses, soudées en anneau par la base; fleurs toutes égales.

TABLEAU DES ESPÈCES


Involucre à folioles ovales non épineuses; feuilles supérieures pennatifides, lobées ou presque entières. **C. Scolymus** 2001
 Involucre à folioles ovales-lancéolées terminées par une forte épine; toutes les feuilles même les supérieures profondément pennatifides . . . **C. Cardunculus** 2002



Cinara Scolymus

2001. — *Cinara Scolymus* L. *Artichaut*. — Plante vivace de 8-15 dm., dressée, raide, robuste, anguleuse; feuilles blanchâtres ou tomenteuses en dessous, dépourvues d'épines, pennatifides, les supérieures pennatifides, lobées ou presque entières; capitule très gros; involucre à folioles largement ovales ordinairement échancrées et mucronées au sommet, charnues à la base; fleurs bleues.

Cultivé pour l'alimentation; patrie originaire inconnue; peut-être forme culturale dérivée de l'espèce suivante. = Août-septembre.



Cinara Cardunculus

2002. — *C. Cardunculus* L. *Cardon*. — Plante vivace de 8-15 dm., dressée, raide, robuste, anguleuse; feuilles blanches, aranéuses ou tomenteuses en dessous, toutes même les supérieures pennatifides à segments lancéolés décurrents à leur base, armés d'épines grêles, subulées, jaunes; capitules gros; involucre subglobuleux à folioles ovales-lancéolées terminées par une épine très robuste; fleurs bleues.

Coteaux arides, bords des chemins de la région méditerranéenne: Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales; Corse. — Portugal, Espagne, Italie, Grèce, Afrique septentrionale. = Juin-juillet.