

*Cirsium montanum**Cirsium rivulare**Cirsium heterophyllum**Cirsium anglicum*

2034. — *Cirsium montanum* Spreng. (C. ALLIONII Thuret). — Plante vivace de 8-12 dm., feuillée supérieurement; feuilles presque glabres, brièvement ciliées-spinuleuses, les inférieures à pétiole ailé, les suivantes sessiles, embrassantes et auriculées, pennatifidées à segments lancéolés; involucre globuleux à folioles étalées, réfléchies, munies d'une callosité linéaire sur le dos, les extérieures linéaires, les moyennes oblongues, atténuées en pointe plus longue que la foliole, toutes terminées par un assez long mucron jaunâtre; capitules nus ou pourvus d'une feuille florale, peu nombreux, à fleurs purpurines.

Bois et ravins des Basses-Alpes et des Alpes-Maritimes. — Ligurie, Croatie, Transylvanie. = Juillet-août.

2035. — *C. rivulare* Link. — Plante vivace de 5-12 dm., dressée, aranéeuse, tomenteuse, ordinairement nue supérieurement; feuilles glabres ou hispides en dessous, brièvement ciliées-spinuleuses, les inférieures à pétiole ailé, les suivantes sessiles, embrassantes et auriculées, pennatifidées, pennatifides ou pennatifidées à segments dentés ou entiers; involucre globuleux à folioles lancéolées, même les extérieures, atténuées en pointe à peine étalée, brièvement mucronulée, portant sur le dos une callosité oblongue, visqueuse; capitules 2-4 agglomérés, rarement solitaires, dépourvus de feuilles florales; fleurs purpurines.

Prés humides, marais des montagnes : Jura, Bugey, Dauphiné, Cantal, Haute-Loire, Lozère, Aveyron, Pyrénées. — Suisse et Europe centrale. = Juin-août.

2036. — *C. heterophyllum* All. — Plante vivace de 6-15 dm., nue au sommet, ordinairement simple et monocéphale; feuilles blanches-tomenteuses en dessous, glabres en dessus, lancéolées, acuminées, entières ou dentées, les inférieures pétiolées, les caulinares rétrécies au-dessus de leur base, sessiles, embrassantes à oreillettes arrondies; involucre gros subglobuleux, à folioles lancéolées, brièvement mucronulées, dépourvues de feuilles florales; fleurs purpurines. — Varie rarement à feuilles caulinares incisées ou pennatifides supérieurement.

Prairies, ravins des hautes montagnes : Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Pyrénées. — Europe moyenne et septentrionale. = Juillet-août.

2037. — *C. anglicum* Link. — Plante vivace; souche à fibres épaisses, toutes cylindriques, tige de 3-7 dm., dressée, simple ou bifurquée, longuement nue au sommet, blanche-laineuse; feuilles blanches et presque tomenteuses en dessous, vertes en dessus, sinuées ou pennatifides à segments indivis ou lobés, ciliées-spinuleuses, les inférieures pétiolées, les caulinares sessiles, demi-embrassantes, non auriculées; involucre assez gros, ovoïde, non déprimé à la base, aranéeux à folioles toutes lancéolées-linéaires, aiguës, longuement atténuées et mucronulées au sommet; fleurs purpurines.

Marais, prés tourbeux : toute la moitié septentrionale de la France, du Nord à l'Auvergne, Ouest. — Europe occidentale et centrale. = Mai-juillet.