

Involucre de 6-7 mm. de largeur ovoïde ou un peu oblong, arrondi à la base; pointe terminale bien plus courte que les cils.

C. leucophæa (p. p.) 2087

Involucre de 4-6 mm. de largeur nettement oblong, sensiblement rétréci à la base; pointe terminale de l'appendice égalant ou dépassant les cils. *C. paniculata* 2088

✚ Folioles de l'involucre à cils raides, la pointe terminale piquante, étalée en dehors, très longue, atteignant 3 mm. de longueur; involucre étroit, oblong, large de 4 mm. environ; achaines dépourvus d'aigrette *C. diffusa* 2089

△ Folioles de l'involucre munies d'épines.

♣ Fleurs jaunes.

✚ Feuilles non décurrentes, les supérieures pennatiséquées; appendices des folioles de l'involucre décurrents, ciliés, terminés par une épine étalée égalant la foliole ou plus courte; achaine à ombilic poilu. *C. collina* 2090

✚ Feuilles décurrentes, les supérieures entières; appendices des folioles de l'involucre non décurrents ni ciliés; achaine à ombilic glabre.

Plante blanche-tomentueuse à capitules solitaires; appendices à épine très longue (2-3 fois plus longue que la foliole) avec 2-3 spinules de chaque côté de la base; fleurs non glanduleuses. *C. solstitialis* 2091

Plante verte, non tomentueuse à capitules souvent agrégés; appendices à épine n'étant pas 2 fois plus longue que la foliole et ordinairement spinuleuse de la base jusqu'à la moitié de leur longueur; fleurs glanduleuses.

C. melitensis 2092

♣ Fleurs purpurines.

⊗ Involucre à appendices cornés, terminés par une très longue épine étalée, beaucoup plus longue que les spinules basilaires et atteignant 10 à 15 mm., achaines dépourvus d'aigrette; fleurs non rayonnantes.

C. Calcitrapa 2093

⊗ Involucre à appendices terminés par des épines courtes, divergentes en éventail peu inégales, la plus longue ne dépassant pas 6 mm.; achaines pourvus d'aigrette.

✚ Feuilles au moins les moyennes fortement décurrentes; fleurs extérieures largement rayonnantes. *C. napifolia* 2094

✚ Feuilles nullement décurrentes.

Tige lisse; feuilles supérieures embrassantes et auriculées; appendice des folioles à 5-7 épines égalant presque les folioles, l'épine terminale atteignant 5 à 6 mm.; fleurs extérieures rayonnantes.

C. sphærocephala 2095

Tige rude anguleuse; feuilles rarement auriculées; appendice des folioles à 3-5 épines égalant au plus la moitié de la longueur de la foliole, l'épine terminale ne dépassant pas 3 mm.; fleurs extérieures faiblement rayonnantes. *C. aspera* 2096



Centaurea Cyanus

2062. — *Centaurea Cyanus* L. *Bluet*. — Plante annuelle ou bisannuelle de 3-8 dm., d'un vert blanchâtre un peu cotonneuse, dressée, à *rameaux grêles, allongés*; *feuilles non décurrentes*, les inférieures pennatiséquées, pétiolées, les suivantes sessiles, étroites, linéaires; involucre ovoïde à folioles entourées d'une marge fortement décurrente et de cils courts ordinairement argentés; achaines à ombilic barbu surmontés d'une aigrette rousse égalant à peu près leur longueur; fleurs bleues, les extérieures rayonnantes.

Champs, moissons partout; Corse. — Europe, Orient.
= Mai-juillet.