




Centaurea Scabiosa



Centaurea pullata



Centaurea amara



Centaurea Jacea

2067. — *Centaurea Scabiosa* L. — Plante vivace de 35-80 cm., dressée, rameuse au sommet; feuilles glabres ou un peu hispides, pennatiséquées à segments écartés, lancéolés ou linéaires, entiers ou lobés, les caulinares sessiles, les inférieures pétiolées; involucre gros, globuleux, à folioles non recouvertes par les appendices; ceux-ci d'un brun noir, décurrents, ciliés; achaines à aigrette rousse égalant à peu près leur longueur; fleurs purpurines, les extérieures rayonnantes.

Varie notamment à gros involucre de 2-3 cm., à appendices recouvrant presque les folioles involucreales avec cils plus allongés ordinairement blancs (*C. ALPESTRIS* Hegestchw. et Heer; *C. KOTSCHYANA* G. G.).

Champs, moissons dans toute la France. — Presque toute l'Europe. = Juillet-août.

2068. — *C. pullata* L. — Plante bisannuelle pubescente de 5-30 cm.; tige parfois nulle, plus souvent allongée et monocéphale; feuilles pétiolées, la plupart lyrées-pennatifides, les florales dépassant longuement le capitule; involucre, subglobuleux, à folioles bordées d'une marge noire entières lancéolées longuement atténuées, terminées par un appendice linéaire-sétacé bordé de cils blancs, très longs et peu nombreux; achaines couronnés de cils paléiformes dépassant la moitié de leur longueur; fleurs purpurines ou d'un rose pâle, les extérieures rayonnantes.

Bords des chemins, des champs, talus dans l'Hérault, le Gard, les Pyrénées-Orientales. — Portugal, Espagne, Orient, Algérie. = Mai-juin.

2069. — *C. amara* L. — Plante vivace brièvement pubescente, blanchâtre, de 3-6 dm., à rameaux grêles étalés ou dressés-étalés; feuilles étroites, les supérieures linéaires ou linéaires-lancéolées, les florales plus courtes que l'involucre; capitules plus petits que ceux de *C. Jacea*; involucre subglobuleux à folioles cachées par leurs appendices scarieux, concaves, pâles, souvent blancs ou d'un brun clair, entiers ou lacérés; achaines nus au sommet; fleurs purpurines, les extérieures rayonnantes.

Varie à tige et feuilles glabrescentes ou glabres avec les appendices des folioles de l'involucre plus foncés, moins fortement concaves (*C. DUBOISII* BOV.).

Lieux secs, bords des chemins; le type dans la région méridionale, la var. dans presque toute la France. — Europe moyenne et méridionale, Orient, Afrique septentrionale. = Juillet-octobre.

2070. — *C. Jacea* L. *Jacée*. — Plante vivace de 3-6 dm. dressée, glabre ou un peu pubescente; rameaux dressés, courts, épais; feuilles oblongues-lancéolées, les caulinares sessiles entières, les inférieures pétiolées souvent pennatifides; involucre large de 12-15 mm. subglobuleux accompagné de feuilles qui l'égalent ou le dépassent, à folioles surmontés d'un appendice peu concave, irrégulièrement lacéré-frangé et cachées par les appendices; achaines un peu pubescents, unis au sommet; fleurs purpurines, les extérieures rayonnantes.

Prés, lieux frais dans toute la France. — Europe, Sibérie. = Juin-septembre.