



Catanancho caerulea

2122. — *Catanancho caerulea* L. — Plante vivace de 5-8 dm. dressée poilue, rameuse à rameaux très longuement nus au sommet; feuilles linéaires, longuement et étroitement lancéolées, trinervées, les inférieures rétrécies en pétiole offrant ordinairement à la base des dents ou des laciniures; involucre ovoïde à écailles apiculées, les extérieures suborbiculaires, les intérieures lancéolées décurrentes de chaque côté inférieurement sur la foliole; capitules solitaires sur de très longs pédoncules nus, munis seulement au sommet de bractées scarieuses; fleurs bleues.

Coteaux arides, friches, pelouses sèches dans la France méridionale et occidentale suivant une limite Nord allant des Deux-Sèvres, par le Lot et l'Aveyron, à Vienne en Dauphiné. — Espagne, Ligurie, Piémont. = Juin-août.

### Genre 425. — LAMPSANA Tourn.

(Du grec *lapadzein*, purger.)

Involucre à 8-10 folioles dressées, égales; réceptacle nu; achaines très finement striés, comprimés, oblongs, amincis à la base, nus au sommet privé de rebord saillant.



Lampsana communis

2123. — *Lampsana communis* L. — Plante annuelle à tige de 3-8 dm., dressée, glabre ou pubescente inférieurement (très rarement glandulifère), rameuse à rameaux étalés-dressés; feuilles presque toutes pétiolées, les inférieures lyrées à lobe terminal très grand, denté, tronqué ou cordé à la base, les supérieures lancéolées, atténuées inférieurement; capitules petits sur des pédoncules grêles et nus en panicule lâche assez grande; involucre ovoïde, glabre, caliculé; achaines longs de 4 1/2 mm. environ; fleurs jaunes.

Lieux cultivés ou incultes, dans toute la France; Corse. — Europe, Algérie. = Juin-août.

### Genre 426. — ARNOSERIS Gaertn.

(Du grec *ars*, agneau, *seris*, chicorée; chicorée des agneaux.)

Involucre à folioles nombreuses disposées sur un seul rang et conniventes à la maturité, muni à sa base d'un calicule de folioles très petites; réceptacle nu; achaines renflés, relevés de fortes côtes, un peu rugueux et terminés par un rebord membraneux court.



Arnoseric minima

2124. — *Arnoseric minima* K. (*HYOSERIC MINIMA* L.). — Plante annuelle à tiges de 1-3 dm. dressées inférieurement, non feuillées, simples ou portant 2-3 capitules, glabres, rougeâtres; feuilles toutes radicales en rosette, dentées, pubescentes, obovales-oblongues, atténuées à la base; pédoncules scapiformes, fortement renflés et fistuleux sous les capitules solitaires; involucre fructifère à la fin globuleux à folioles très fortement conniventes offrant une forte nervure dorsale blanche; achaines très petits, de 1 3/4 mm. environ de longueur; fleurs jaunes.

Champs et moissons des terrains siliceux dans presque toute la France; Corse; rare ou nul dans la région méditerranéenne. — Presque toute l'Europe surtout moyenne. = Juin-juillet.