



Scorzonera hispanica

2159. — *Scorzonera hispanica* L. — Plante vivace à racine épaisse, pivotante, dépourvue de chevelu au collet; tige de 3-10 dm., dressée, rameuse, polycéphale, rarement courte et monocéphale, feuillée, glabre ou un peu cotonneuse; feuilles caulinaires nombreuses, très variables, ovales-lancéolées ou lancéolées-linéaires (*GLASTIFOLIA* Wallr.) ou linéaires-graminiformes (*ASPHODELOIDES* Wallr.), rétrécies à la base, quelquefois assez profondément denticulées sur les bords (*CRISPULA* Boiss.), les supérieures terminées en longue pointe subulée; achaines fortement muriqués, presque spinuleux; fleurs jaunes, une fois plus longues que l'involucre.

Bois, prés secs, des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales, Dauphiné, Savoie, Lozère, Aveyron, Landes, Charente-Inférieure, Cher. — Europe centrale et méridionale, de l'Espagne et de la Suisse à la Russie. = Mai-juillet.

Genre 440. — **PODOSPERMUM** DC.

(Du grec *pous*, pied, *sperma*, graine: graine pourvue d'un support.)

Diffère du genre *Scorzonera* par les achaines portés sur un pédicule ou support creux, renflé, un peu plus court que l'achaine.



Podospermum laciniatum

2160. — *Podospermum laciniatum* DC. — Plante bisannuelle à racine pivotante; tiges de 10-45 cm., dressées, feuillées, rameuses, rarement simples, glabres, à rameaux ascendants, quelquefois à tiges latérales étalées; feuilles profondément pennatifides ou pennatiséquées, à segments linéaires, linéaires-lancéolés ou lancéolés-élargis, rarement réduites au rachis (*P. SUBULATUM* DC.); achaines subcylindriques, striés, lisses, supportés par un pédicule creux, un peu plus court que l'achaine; aigrette d'un blanc sale; fleurs d'un jaune pâle ne dépassant guère l'involucre. Espèce polymorphe.

Lieux incultes, bords des chemins, vignes et champs pierreux dans presque toute la France. — Europe moyenne et méridionale, Orient, Algérie. = Avril-juillet.

Genre 441. — **TRAGOPOGON** Tourn. — *Salsifs*.

(Du grec *tragos*, bouc, *pógón*, barbe: allusion aux aigrettes.)

Involucre à 5-12 folioles égales, disposées sur un seul rang, un peu soudées à la base, réfléchies à la maturité; réceptacle nu; achaines subcylindriques ou fusiformes longuement atténués en un long bec grêle, munis de côtes plus ou moins scabres; aigrette à soies plumeuses dont les barbes sont diffuses entrecroisées. — Les racines du *Tragopogon porrifolius* sont souvent cultivées pour l'usage alimentaire.

TABLEAU DES ESPÈCES.

Fleurs jaunes.

Pédoncules cylindriques à diamètre à peu près égal, non ou très faiblement renflés au sommet; fleurs égalant l'involucre ou plus longues, rarement plus courtes.

T. pratensis 2161

Pédoncules fistuleux et largement renflés en massue au sommet, surtout à la maturité; involucre dépassant toujours assez longuement les fleurs.

T. dubius 2162