

Genre 445. — **TARAXACUM** Juss. — *Pissenlit.*(Du grec *taraxis*, trouble, *akeomai*, guérir : allusion à de prétendues propriétés médicales.)

Involucre ovale ou ovale-oblong, à folioles nombreuses, inégales, imbriquées, toutes réfléchies à la maturité, les extérieures courtes simulant un calicule; réceptacle nu; achâines oblongs, cylindracés, un peu comprimés, munis de côtes muriquées et épineuses au sommet, surmontés d'un long bec filiforme; aigrette blanche ou un peu rousse à soies simples, disposées sur plusieurs rangs; fleurs jaunes; plantes acaules monocéphales.

Les feuilles de Pissenlit sont employées comme salade.

TABLEAU DES ESPÈCES

- > Feuilles apparaissant bien avant les fleurs.
 - || Folioles extérieures de l'involucre dressées, appliquées contre les intérieures; feuilles presque dressées, sinuées-dentées, ou entières (quelquefois pennatifides); capitules petits ou médiocres.
 - | Feuilles longuement et étroitement oblongues-ovoïdes ou oblongues-sublinéaires glabres ainsi que les pédoncules, entières ou lâchement sinuées; involucre ovale, non rétréci à la base, à folioles vertes . . . **T. palustre** 2171
 - | Feuilles petites oblongues-ovoïdes, dentées (quelquefois pennatifides); involucre étroit, presque obconique, à folioles rougeâtres; capitules pauciflores deux fois plus petits que dans le précédent; pédoncules d'abord cotonneux. **T. leptocephalum** 2172
 - || Folioles extérieures de l'involucre étalées ou réfléchies; feuilles étalées en rosette; gros capitules.
 - Feuilles oblongues ou oblongues-ovoïdes, toutes roncinées, pennatifides ou pennatipartites à lobes amples triangulaires-lancéolés ou à lanières étroites et très profondes, atténuées à la base, non contractées en pétiole. **T. officinale** 2170
 - Feuilles largement ovoïdes, très obtuses et arrondies au sommet, à limbe presque aussi large que long, denté ou à peine ronciné, souvent nettement pétiolées. Achâines subcylindriques subitement rétrécis au sommet, fortement muriqués-épineux **T. obovatum** 2174
 - Achâines très étroitement fusiformes, fortement et assez longuement atténués au sommet qui est faiblement muriqué, non épineux. **T. serotinum** 2175
- > Feuilles petites naissant après ou avec l'apparition des fleurs, à lobes courts et assez larges; plante automnale **T. gymnanthum** 2173



2170. — *Taraxacum officinale* Wiggers (T. *DENS-LEONIS* Desf.) *Dent-de-Lion.* — Souche vivace épaisse; pédoncules radicaux de 6-30 cm. dressés ou ascendans, monocéphales; feuilles toutes radicales, en rosette, glabres ou glabrescentes, atténuées à la base, *roncinées*, *pennatifides* ou *pennatipartites* à *segments triangulaires-lancéolés*; involucre à folioles entières ou denticulées au sommet pourvu ou non de callosité, *les extérieures étalées ou réfléchies*; achâines grisâtres, épineux au sommet, égalant le bec ou plus court; fleurs jaunes.

Varie à feuilles souvent étroitement lacinées avec des achâines grisâtres (T. *LEVIGATUM* Desf.) ou avec achâines rouges (T. *ERYTHROSPERMUM* Andrz.).

Prés, bords des chemins, lieux incultes, partout; Corse. — Europe, Sibérie, Japon, Afrique septentrionale, Amérique septentrionale. — Avril-octobre.