



Lactuca Chaixi

2180. — Lactuca Chaixi Vill. (L. sagittata W. K.). — Plante bisannuelle à racine napiforme; tige de 6-13 dm., dressée, glabre, à rameaux ascendants; feuilles sagittées, glabres, à nervure dorsale lisse, dressées, ovales-lancéolées ou oblongues-lancéolées, acuminées, indivises, denticulées, les supérieures lancéolées-linéaires, entières, les primordiales lyrées ou entières, à long pétiole; capitules pédonculés en panicule corymbiforme, assez courte; fleurs jaunes; bec épais, noir, deux à trois fois plus court que l'achaine.


Bois des Hautes-Alpes autour de Gap, Alpes-Maritimes. — Italie septentrionale et orientale, Istrie, Croatie, Hongrie, Autriche jusqu'à la Russie méridionale. = Août.



Lactuca sativa

2181. — L. sativa L. L. cultivée. — Plante annuelle de 6-12 dm., dressée, très glabre et lisse, rameuse, très feuillée; feuilles glabres, absolument dépourvues d'aiguillons ou de cils spinuleux, les moyennes et les supérieures largement ovales, obtuses, molles, ondulées, irrégulièrement dentées (rarement laciniées), embrassantes, cordées à la base; capitules petits, en panicule corymbiforme contractée, à ramifications rapprochées, ascendantes; fleurs jaunes; achaines grisâtres ou blanchâtres.

Espèce variable abondamment cultivée dans les jardins potagers; les botanistes s'accordent à la considérer comme dérivée de *L. Scariola* (Alph. de Candolle : Origine des plantes cultivées). = Juin-septembre.



Lactuca Scariola

2182. — L. Scariola L. Scariole. — Plante bisannuelle à tige de 6-10 dm., dressée, glabre, hispide à la base, à rameaux étalés; feuilles dressées, la plupart déviées obliquement à leur base, glauques, spinuleuses sur les bords et sur la nervure dorsale, embrassantes et auriculées, pennatifides ou pennatilobées, à lobes larges; capitules subsessiles ou pédonculés en panicule corymbiforme, étalée; fleurs jaunes; achaines obovales gris, à bords aigus, munis de cils courts au sommet, égalant à peu près le bec ou un peu plus long.

Varie à feuilles oblongues-obovales ou spatulées, indivises, à bord denticulés tout autour (*L. dubia* Jord.).

Bords des chemins, lieux incultes, dans presque toute la France, sauf le Nord; Corse. — Europe, Sibérie, Asie Mineure, Arabie, Perse, Algérie, Abyssinie. = Juillet-août.



Lactuca virosa

2183. — L. virosa L. L. vireuse. — Espèce bisannuelle, voisine de la précédente: tige plus robuste, plus hispide inférieurement, avec une teinte générale violacée; feuilles plus fermes, étalées, non déviées obliquement, ordinairement indivises ou seulement sinuées, rarement roncées, à nervure dorsale aiguillonnée; achaines noirs, à bords épaissis, lisses ou parfois hispides au sommet, un peu plus largement obovales.

Bords des chemins, lieux incultes dans presque toute la France; Corse. — Europe moyenne et méridionale, Algérie. = Juillet-août.