

- Feuilles dentées ou entières parfois un peu subpanduriformes ; achaines roux ou bruns . . . . . *H. Vallesiacum* (p. p.) 2298
- Feuilles profondément dentées ou même incisées à leur base ; achaines grisâtres ou d'un roux clair . . . . . *H. lycopifolium* 2299
- \* Tige non hérissée ; pédicelles très glanduleux ; capitules grêles cylindriques ou subcylindriques ; feuilles auriculées fréquemment panduriformes ou subpanduriformes (sauf dans *lanceolatum*), à réseau de veines nombreuses et anastomosées sur les bords ; ligules ciliées.
- § Feuilles toutes ou plusieurs panduriformes.
- < Corymbe à rameaux étalés-dressés ; feuilles caulinaires peu nombreuses demi-embrassantes et auriculées, les inférieures rétrécies en pétiole ailé ; achaines noirâtres, marron ou pourpre foncé. *H. juranum* 2293
- < Corymbe lâche, étalé-divariqué ; feuilles nombreuses conformes toujours, très fortement embrassantes et panduriformes ; achaines pâles, grisâtres. . . . . *H. prenanthoides* 2296
- § Feuilles jamais panduriformes, assez nettement lancéolées, se rétrécissant presque régulièrement de la base au sommet, acuminées, aiguës, demi-embrassantes ; achaines pâles, grisâtres ou rougeâtres. *H. lanceolatum* 2297
- > Pédoncules pourvus seulement de poils étoilés ou entremêlés de quelques rares poils glanduleux ou non ; feuilles jamais panduriformes.
- ♂ Folioles extérieures de l'involucre étalées-recourbées au sommet, glabres ou presque glabres ; corymbe terminal ombelliforme. *H. umbellatum* 2313
- ♂ Folioles de l'involucre toutes appliquées, munies de poils étoilés et de quelques rares poils simples parfois glanduleux.
- Feuilles à nervures peu saillantes non anastomosées, lancéolées, atténues à la base qui est arrondie non subembrassante, les moyennes un peu pétiolées, les inférieures nettement et assez longuement pétiolées . . . . . *H. rigidum* 2311
- Feuilles distinctement nervées-anastomosées en dessous, lancéolées, sessiles, à base élargie subembrassante chez les feuilles moyennes. *H. corymbosum* 2312
- Feuilles indistinctement veinées, sessiles, les moyennes et les inférieures arrondies et nettement demi-embrassantes à la base, souvent larges, ovales et assez amples. . . . . *H. boreale* 2310

Sous-genre I. — **PILOSELLA** Fries.

2230. — *Hieracium Pilosella* L. *Piloselle*. — Souche vivace émettant des stolons allongés, feuillés ; pédoncule radical de 1-3 dm. dressé, nu, pubescent, monocéphale ; feuilles entières, oblongues-lancéolées ou oblongues-ovoïdes, blanchâtres-tomenteuses en dessous, hérissées de soies sur les deux faces, toutes en rosette radicale ; involucre à folioles pubescentes, souvent glanduleuses ; capitule médiocre à fleurs jaunes, ligules de la circonference purpurines en dessous.

Varie rarement à feuilles vertes en dessous (var. *VIRGINS* Fr.) et à feuilles blanches-farineuses sur les deux faces (var. *INCANUM* DC. ; *H. VELUTINUM* Fr.).

Lieux secs, coteaux partout en France ; Corse. — Europe, Orient, Afrique septentrionale. — Mai-septembre.

