



Campanula thyrsoidea

2352. — *Campanula thyrsoidea* L. — Plante bisannuelle de 10-30 cm., velue-hérissée, à racine charnue, en fuseau; tige simple, dressée, épaisse, creuse et compressible, très feuillée; feuilles imbriquées, allongées, lancéolées, obtuses, entières, non pétiolées, velues; fleurs d'un blanc jaunâtre, imbriquées en épis gros et court, oblong, compact, feuillé à la base; calice à tube glabre, à lobes velus, ovales-lancéolés, égalant le tiers de la corolle; celle-ci moyenne, barbue, divisée jusqu'au tiers en lobes ovales-aigus; style saillant; capsule dressée.

Pâturages rocailloux des hautes montagnes: Chaîne du Jura; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence. — Chaîne des Alpes, jusque dans la Croatie. = Juillet-août.



Campanula spicata

2353. — *C. spicata* L. — Plante bisannuelle de 20-60 cm., velue-blanchâtre, à racine grosse, en fuseau; tige dressée, pleine, dure, épaisse et très feuillée à la base; feuilles rapprochées, oblongues-lancéolées, aiguës, ondulées-crênelées, non pétiolées, hérissées-scabres; fleurs d'un bleu foncé, sessiles en épi long et étroit, interrompu et feuillé à la base, occupant presque toute la tige; calice hispide, à lobes linéaires, égalant à peine le tiers de la corolle; celle-ci presque en entonnoir, poitue, divisée jusqu'au tiers en lobes lancéolés; style inclus; capsule dressée.

Pâturages des hautes montagnes: Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence. — Italie, Sardaigne, Suisse, Tyrol, Carinthie, Carniole, Styrie, Croatie. = Juillet-août.



Campanula Cervicaria

2354. — *C. Cervicaria* L. — Plante vivace de 40-80 cm., velue-hérissée, à racine épaisse, charnue; tige assez forte, dressée, simple, pleine, lâchement feuillée; feuilles inférieures lancéolées, atténuées en long pétiole ailé, régulièrement crênelées, hérissées-scabres; fleurs bleues, sessiles en têtes terminales et latérales entourées de larges bractées foliacées; calice hispide, à lobes ovales, obtus, égalant le milieu de la corolle; celle-ci égalant à peine 2 cm., velue, divisée jusqu'au tiers; style saillant; capsule dressée.

Bois du Nord-Est et du Centre, des environs de Paris aux Ardennes, à la Haute-Savoie et au Puy-de-Dôme; nul dans l'Ouest et le Midi. — Europe, surtout centrale. = Juin-septembre.



Campanula glomerata

2355. — *C. glomerata* L. (*C. AGGREGATA* NOCCA). — Plante vivace de 10-50 cm., velue ou glabrescente, à racine grêle et dure; tiges assez grêles, pleines, feuillées; feuilles inférieures ovales, oblongues ou lancéolées, arrondies ou en cœur à la base, pétiolées, crênelées, pubescentes; fleurs bleues, sessiles en têtes terminales et latérales entourées de larges bractées foliacées; calice poitue, à lobes lancéolés-aigus, égalant le milieu de la corolle; celle-ci de 2 cm. et plus, velue, divisée jusqu'au tiers; style inclus; capsule dressée.

Bois, coteaux, prairies, surtout calcaires, dans presque toute la France. — Europe; Asie occidentale et boréale, Japon. = Juin-septembre.