



Campanula Trachelium



Campanula rapunculoides



Campanula bononiensis



Campanula rhomboidalis

- ✕ **2360. — Campanula Trachelium L. Gantelée.** — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, velue-hérissée, à souche épaisse, sans stolons; tiges robustes, pleines, anguleuses, très rudes, très feuillées, simples ou rameuses; feuilles grandes, ovales-triangulaires, en cœur à la base, pétiolées, fortement dentées, poilues, scabres; fleurs bleues, dressées, en grappes feuillées multiflores, 2-3 sur les pédoncules bractéolés à leur base; calice hispide, à lobes lancéolés, égalant le tiers de la corolle; celle-ci grande (3-4 cm.), divisée jusqu'au tiers, à lobes lancéolés et barbus; capsule penchée.

Bois et ravins, dans toute la France. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Juin-septembre.

- ✕ **2361. — C. rapunculoides L.** — Plante vivace de 30-80 cm., pubescente, à souche longuement rampante-stolonifère; tiges assez robustes, pleines, arrondies, rudes, feuillées, simples; feuilles grandes, ovales-lancéolées, un peu en cœur, pétiolées, dentées, vertes et pubescentes, à peine rudes; fleurs bleues, penchées, en grappes spiciformes unilatérales, lâches, non feuillées, solitaires sur les pédoncules; calice glabrescent, à lobes lancéolés, réfléchis après la floraison, égalant à peine le tiers de la corolle; celle-ci moyenne (2-3 cm.), divisée jusqu'au tiers, à lobes lancéolés et barbus; capsule penchée.

Bois et champs pierreux, surtout calcaires, dans une grande partie de la France; nul dans l'Ouest et presque tout le Midi. — Presque toute l'Europe; Asie Mineure, Caucase. = Juin-août.

- 2362. — C. bononiensis L.** — Plante vivace de 30-60 cm., tomenteuse-blanchâtre, à racine en navet, sans stolons; tiges assez robustes, pleines, arrondies, presque lisses, simples, feuillées; feuilles inférieures grandes, ovales en cœur, pétiolées, finement dentées, blanches-tomenteuses en dessous, à peine rudes; fleurs bleues, penchées, en grappes spiciformes pyramidales, serrées, non feuillées, à pédoncules bitriflores; calice glabre, à lobes lancéolés, étalés, égalant à peine le quart de la corolle; celle-ci petite (1-2 cm.), glabre, divisée jusqu'au tiers; capsule penchée.

Bois des montagnes du Sud-Est: Savoie, Haute-Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes. — Europe centrale et orientale; Caucase, Sibérie. = Juin-août.

- ✕ **2363. — C. rhomboidalis L.** — Plante vivace de 30-60 cm., poilue ou glabrescente, à souche dure, non charnue; tiges élancées, creuses, anguleuses, très feuillées; feuilles toutes ovales rhomboidales ou ovales-lancéolées, 1-2 fois plus longues que larges (2-3 cm. de long sur 1-2 de large), élargies à la base, sessiles, dentées en scie, visiblement nervées; fleurs bleues, penchées, 2-10 en grappe ou en panicule étroite, unilatérale; calice glabre, à lobes linéaires, étalés-réfléchis, dépassant souvent la moitié de la corolle; celle-ci petite (1-2 cm.), glabre; capsule penchée.

Bois et pâturages des hautes montagnes: Haut-Jura; Alpes; Pyrénées. — Espagne, Suisse, Italie septentrionale. = Juin-août.