

TABLEAU DES ESPÈCES

Feuilles persistantes, coriaces, à bords enroulés; jeunes rameaux finement pubescents; corolle en cloche, divisée jusqu'au tiers; anthères sans cornes; fruits rouges, acides.

V. Vitis-idæa 2372

Feuilles caduques, peu épaisses, non enroulées; jeunes rameaux glabres; corolle en grelot, à lobes très courts; anthères munies sur le dos de 2 cornes; fruits noirs-bleuâtres, à saveur douce et sucrée.

Feuilles entières, obovales-obtuses, très glauques en dessous; rameaux arrondis, grisâtres; calice à dents courtes et arrondies; fleurs en petites grappes au sommet des anciens rameaux. **V. uliginosum** 2373


Feuilles finement dentées, ovales-aiguës, vertes; rameaux anguleux-aillés, verts; calice à limbe presque entier; fleurs solitaires ou géminées. **V. Myrtillus** 2374



Vaccinium Vitis-idæa

2372. — Vaccinium Vitis-idæa L. Canche. — Sous-arbrisseau de 10-30 cm., à tiges radicales à la base, à rameaux dressés, grêles, arrondis, verts, finement pubescents; feuilles persistantes, coriaces, obovales, obtuses ou émarginées, entières ou denticulées au sommet, à bords enroulés, vertes et luisantes en dessus, pâles, faiblement nervées et marquées de points glanduleux en dessous; fleurs blanches ou rosées, en petites grappes terminales penchées; calice à 5 lobes triangulaires; corolle en cloche, à lobes roulés en dehors; baies globuleuses, rouges, acidules.

Pâturages et bois des montagnes : Vosges, Jura, Alpes, Morvan; Forez, Cévennes, Auvergne; Normandie et région parisienne; Ariège. — Europe centrale et boréale; Caucase, Sibérie, Japon; Amérique boréale. = Fl. mai-juillet, fr. août-septembre.



Vaccinium uliginosum

2373. — V. uliginosum L. — Sous-arbrisseau de 30-80 cm., glabre et glauque-bleuâtre, rameaux en buisson, à rameaux dressés, arrondis, grisâtres; feuilles caduques, obovales, obtuses ou émarginées, très entières, planes, d'un vert mat en dessus, très glauques et veinées en réseau en dessous; fleurs blanches ou rougeâtres, en petites grappes penchées au sommet des anciens rameaux; calice à lobes courts et arrondis; corolle en grelot ovoïde, à lobes courts et réfléchis; baies globuleuses, d'un noir bleuâtre, fades et sucrées, comestibles.

Marais, landes et bois humides des montagnes siliceuses : Vosges, Jura, Alpes; Forez, Auvergne, Cévennes, Pyrénées. — Europe centrale et boréale; Sibérie, Japon; Amérique boréale. = Fl. mai-juillet, fr. août-septembre.



Vaccinium Myrtillus

2374. — V. Myrtillus L. Myrtille. — Sous-arbrisseau de 20-60 cm., très glabre et vert, à rameaux dressés, anguleux-aillés, verts; feuilles caduques, ovales-aiguës, finement dentées, planes, d'un vert pâle et finement nervées en dessous; fleurs d'un blanc verdâtre et rosé, penchées, solitaires ou géminées à l'aisselle des feuilles; calice à limbe presque entier; corolle en grelot subglobuleux, à lobes courts et réfléchis; baies dressées, globuleuses, d'un noir bleuâtre, douces et sucrées.

Bois et bruyères des montagnes siliceuses, dans une grande partie de la France; nul dans les plaines de l'Ouest et du Midi; Corse. — Europe centrale et boréale; Caucase, Sibérie; Amérique boréale. = Fl. avril-juin, fr. juillet-août. — Les baies (aires) sont comestibles.