

Genre 472. — **AZALEA** L. (**LOISELEURIA** Desv.).(Du grec *asaleos*, aride : plante croissant dans les rocaillies.)

1 seule espèce.

2382. — Azalea procumbens L. (**LOISELEURIA PROCUMBENS** Desv.). — Petit sous-arbrisseau de 10-30 cm., glabre, à tiges couchées-étalées à rameaux diffus ; feuilles persistantes, opposées, rapprochées, petites, ovales, obtuses, convexes, roulées par les bords, entières, pétiolées, coriaces, glabres, vertes et luisantes sur les deux faces ; fleurs roses, petites, dressées, 2-5 en ombelles terminales ; pédoncules plus courts que la fleur ; calice à 5 lobes ovales-lancéolés, glabres ; corolle caduque, en cloche, fendue jusqu'au milieu en 5 lobes réfléchis ; 5 étamines ; capsule subglobuleuse, glabre, à 2-3 loges et 2-3 valves bifides.

Rochers et pelouses des hautes montagnes siliceuses : Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence. — Europe centrale et boréale ; Amérique boréale et terres arctiques. = Juin-juillet.

*Azalea procumbens*Genre 473. — **DABŒCIA** Don.

(De Saint-Dabéoc, nom irlandais.)

1 seule espèce.

2383. — Dabœcia polifolia Don. (**MENZIESIA DABŒCI** DC.). — Petit sous-arbrisseau de 20-30 cm., hispide, à tiges décombantes, à rameaux redressés, poilus-glanduleux au sommet ; feuilles persistantes, alternes, ovales-elliptiques (1 cm. de long sur 4-5 mm. de large), brièvement pétiolées, entières, coriaces, vertes et luisantes en dessus, blanches-tomenteuses et à bords roulés en dessous ; fleurs violacées, penchées, 3-8 en grappes terminales lâches et longues ; pédoncules hispides, plus courts que la fleur ; calice hispide, à 4 lobes 5-6 fois plus courts que la corolle ; celle-ci caduque, en grelot ovale, à 4 dents courtes ; 8 étamines ; capsule oblongue, velue, à 4 loges et 4 valves.

Bois et landes de l'Ouest : Maine-et-Loire, Gironde, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Tarn-et-Garonne. — Irlande, Espagne et Portugal. Iles Açores. = Juin-octobre.

*Dabœcia polifolia*Genre 474. — **CALLUNA** Salisb.(Du grec *callunein*, balayer, orner : la bruyère sert à faire des balais.)

1 seule espèce.

✓ **2384. — Calluna vulgaris** Salisb. (**ERICA VULGARIS** L.). *Bruyère commune*. — Sous-arbrisseau de 30 cm. à 1 mètre, glabre, tortueux, diffus, à rameaux nombreux, effilés, dressés, rougeâtres ; feuilles petites, opposées, densément imbriquées sur 4 rangs, linéaires, sessiles et à 2 pointes à la base ; fleurs roses, brièvement pédonculées, penchées, en grappes simples et lâches ; calice pétaloïde, muni à la base de bractées vertes, à 4 lobes oblongs ; corolle de moitié plus courte que le calice, marcescente, en cloche, à 4 lobes ; 8 étamines, incluses ; capsule velue, globuleuse, à cloisons opposées aux sutures des 4 valves. — Varie à rameaux velus-grisâtres (var. *PUBESCENS* Koch).

Landes, bois et coteaux arides des terrains siliceux ; dans toute la France. — Europe ; Asie occidentale, Maroc et Iles Açores ; Amérique boréale. = Juillet-octobre. — Produit la terre de bruyère.

*Calluna vulgaris*