

1207. — *Rosa moschata* Mill. (*R. RUSCINONENSIS* Déségl. et Gren.). — Arbrisseau et tiges sarmenteuses, décombantes, allongées; aiguillons épars, crochus; feuilles persistantes, les moyennes des rameaux à 7-9 folioles glabres ou pubescentes, ovales-lancéolées, à dents simples et superficielles; stipules étroites à oreillettes divergentes; bractées étroites, dressées, promptement caduques; fleurs blanches, parfois doubles, grandes, 3-8 en corymbe; pédicelles longs, souvent velus; boutons allongés, ovoïdes-lancéolés; sépales lancéolés-acuminés, faiblement appendiculés, réfléchis après la floraison, caducs; colonne styloïde pubescente à la base, égalant les étamines; fruit petit.

Naturalisé dans les haies du Roussillon jusqu'à Narbonne; Provence, à Hyères; Europe méridionale; Afrique septentrionale. — Indigène en Asie, depuis la Chine jusqu'à la Perse et l'Abyssinie. = Mai-juin.

1208. — *R. sempervirens* L. — Arbrisseau à tiges sarmenteuses, décombantes, allongées; aiguillons épars, crochus; feuilles persistantes, à 5 folioles coriaces, glabres, luisantes, ovales-acuminées, à dents simples, superficielles, conniventes; stipules étroites, à oreillettes un peu divergentes; bractées primaires étalées ou réfléchies après la floraison; fleurs blanches, le plus souvent en corymbes; pédicelles longs, glanduleux; boutons courts, ovoïdes, contractés au sommet; sépales ovales-aigus, non acuminés, presque entiers, réfléchis, caducs; colonne styloïde velue, égalant les étamines; fruit petit.

Haies et coteaux secs du Midi et de l'Ouest jusqu'à la Loire-Inférieure; Corse. — Europe méridionale, du Portugal à la Turquie; Afrique septentrionale. = Mai-juin.

1209. — *R. pervirens* Gren. — Intermédiaire entre le précédent et le suivant. Arbrisseau décombant, à aiguillons épars; feuilles tardivement caduques, à 5-7 folioles glabres ou pubescentes en dessous, un peu épaisses et luisantes, souvent aiguës, à dents assez profondes, non conniventes; bractées primaires étalées; fleurs blanches, en corymbes ou solitaires, à pédicelles glanduleux; boutons courts, ovoïdes; sépales ovales-aigus, presque entiers, réfléchis, caducs; colonne styloïde presque toujours glabre, égalant les étamines; fruit petit.

Haies et coteaux secs du Midi et de l'Ouest: Gard, Aveyron, Gers, Charente. — Italie: Ligurie. = Juin-juillet.

1210. — *R. arvensis* Huds. — Arbrisseau sarmenteux, décombant, à aiguillons épars; feuilles promptement caduques, à 5-7 folioles souvent pubescentes, glaucescentes en dessous, minces, non luisantes, souvent obtuses, à dents simples, larges, non conniventes; stipules assez étroites, à oreillettes dressées; bractées primaires dressées; fleurs blanches, en corymbes ou solitaires, à pédicelles glanduleux; boutons courts, ovoïdes; sépales ovales-aigus, presque entiers, réfléchis, caducs; colonne styloïde glabre, égalant les étamines; fruit petit.

Bois, haies, bords des champs, dans presque toute la France. — Europe occidentale et centrale. = Mai-juillet.



Rosa moschata



Rosa sempervirens



Rosa pervirens



Rosa arvensis