

Rameaux glabres; fleurs verdâtres, en grappes longues et étroites; corolle globuleuse, très petite (1-2 mm.); anthères sans cornes; arbrisseau atteignant 1 mètre *E. scoparia* 2393

Rameaux velus-hérissés, fleurs blanches ou rosées, en grandes panicules pyramidales; corolle ovoïde ou oblongue; anthères munies de 2 cornes à la base; arbrisseaux de 1-3 mètres.

Rameaux blanchâtres, à poils la plupart rameux; pédoncules plus longs que la corolle, bractéolés vers la base; calice à lobes 2 fois plus courts que la corolle; celle-ci ovoïde (3 mm.). *E. arborea* 2394

Rameaux blancs-grisâtres, à poils simples; pédoncules égalant à peine la corolle, bractéolés vers le milieu; calice à lobes 3-5 fois plus courts que la corolle; celle-ci oblongue (4 mm.). *E. lusitanica* 2395

- ✓ 2385. — *Erica ciliaris* L. — Sous-arbrisseau de 30-80 cm., à tiges tortueuses, à rameaux hérissés de poils parfois glanduleux; feuilles verticillées par 3-4, longues de 2-3 mm., ovales-aiguës, blanchâtres en dessous, bordées de cils raides; fleurs purpurines, en grappes spiciformes unilatérales; pédoncules bien plus courts que les fleurs; calice à lobes lancéolés, longuement ciliés, 5-6 fois plus courts que la corolle; celle-ci en grelot tubuleux (8-10 mm.), un peu renflée au milieu et courbée au sommet, à dents très courtes; anthères incluses, sans cornes; style saillant; capsule glabre.

Landes et bois siliceux, dans tout l'Ouest, jusqu'à l'Indre-et-Loire et les environs de Paris. — Angleterre et Irlande, Espagne et Portugal. = Juin-octobre.



Erica ciliaris

- ✓ 2386. — *E. Tetralix* L. — Sous-arbrisseau de 30-80 cm., à tiges tortueuses, à rameaux pubescents ou souvent velus-glanduleux; feuilles verticillées par 4, longues de 4 mm., linéaires-oblongues, blanchâtres en dessous, hérissées de cils raides; fleurs roses, réunies 5-12 en têtes terminales ombelliformes; pédoncules plus courts que les fleurs; calice à lobes lancéolés, longuement ciliés, 3-4 fois plus courts que la corolle; celle-ci en grelot ovale (5-7 mm.), à dents courtes et réfléchies; anthères incluses, munies de 2 cornes à la base; style peu saillant; stigmat en tête; capsule velue-soyeuse.

Landes et pâturages humides des terrains siliceux, dans tout l'Ouest, le Nord et le Centre; Pyrénées; nul dans l'Est et le Midi. — Europe occidentale et centrale, jusqu'à la Hongrie. = Juin-octobre.



Erica Tetralix

2387. — *E. mediterranea* L. — Arbrisseau de 1-2 mètres, glabre, à tiges et rameaux dressés, lâches; feuilles verticillées par 4, longues de 5-7 mm., linéaires, marquées d'un sillon en dessous, glabres; fleurs roses, géminées, penchées, en grappes unilatérales; pédoncules plus courts que les fleurs, bractéolés vers le milieu; calice à lobes lancéolés, glabres, égalant au moins la moitié de la corolle; celle-ci ovoïde-tubuleuse (5-7 mm.), à lobes dressés, obtus; anthères demi-saillantes, prolongeant directement le filet, à loges contiguës dans toute leur longueur, sans cornes; style saillant; capsule glabre.

Landes humides de la Gironde, aux environs de Pauillac, Cissac et Saint-Sauveur; signalé dans les Pyrénées-Orientales. — Espagne et Portugal, Baléares, Irlande. = Janvier-mars.



Erica mediterranea